СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

22.10.2020

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению
Х-ГИА

(Организация-разработчик: ООО «МНПК БИОТЕХИНДУСТРИЯ»,
109147 РФ г.Москва, ул.Марксистская д.34, кор.10, пом.20, эт.6)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-32.13-1814 №ПВР-3-5.7/02265

I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Х-ГИА.

Международное непатентованное название: отсутствует.

2. Лекарственная форма: эмульсия для инъекций.

Х-ГИА содержит в качестве действующего вещества гидролизованные ткани пуповины свиньи– 950,0 мг, а в качестве вспомогательного вещества - воду для инъекций - до 1,0 мл.

3. Препарат представляет собой бесцветную прозрачную слегка опалесцирующую эмульсию со слабым специфическим запахом. Допускается небольшой осадок

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 1 год с даты производства. Запрещается использование препарата после окончания срока его годности.

4. Выпускают препарат расфасованным по 12 мл в стеклянные флаконы, герметично укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы помещают поштучно в пачки из картона.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 4°С до 10°С.

6. Х-ГИА следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный препарат с истекшим сроком годности утилизируют в соответствии с требованиями законодательства

8. Отпускается без рецепта.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Фармакотерапевтическая группа - корректоры метаболизма костной и хрящевой ткани.

10. Фармакологическое действие Х-ГИА обусловлено содержанием в его составе биологически активных веществ тканей пуповины – хондроитин сульфата и гиалуроновой кислоты. Хондроитин сульфат обладает способностью сохранять воду в толще хряща в виде микроскопических водных полостей, что обеспечивает амортизационную способность хрящевой ткани и, в итоге, увеличивает ее прочность и подвижность суставов.

Кроме того, хондроитин сульфат подавляет действие специфических ферментов, высвобождающихся в результате разрушения хрящевой ткани. Хондроитин сульфат наряду с гиалуроновой кислотой участвует в построении основного вещества соединительной ткани. Гиалуроновая кислота обладает защитными и иммуномодулирующими свойствами. Играет важную роль в осуществлении репаративных процессов соединительных тканей (синтез гликозаминогликанов), снижении воспалительных реакций, улучшении кровоснабжения тканей.

По степени воздействия на организм Х-ГИА относится к 4 классу опасности согласно ГОСТ 12.1.007 (вещества малоопасные). В рекомендуемых дозах и концентрациях не оказывает местно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия.

III. Порядок применения

11. Х-ГИА применяют для профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата у сельскохозяйственных и домашних животных.

12. Противопоказанием к применению Х-ГИА является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. При работе с ПДЭ необходимо соблюдать общие требования безопасности, предъявляемые к работе с лекарственными препаратами для ветеринарного применения. При попадании в глаза – промыть проточной водой.

14. Особенностей действия препарата в случаях применения у беременных животных, у животных в период лактации, у потомства животных не выявлено

15. Х-ГИА применяют внутримышечно в следующих дозах: для животных массой до 5 кг – 0,5 мл на животное, до 25 кг – 1,0 мл на животное, свыше 25 кг – 2,0 мл на животное. Курс лечения – 7-10 инъекций с интервалом 48 часов. Инъекцию необходимо делать в мягкие ткани ближе к пораженному суставу. Перед употреблением взбалтывать.

15. Применение Х-ГИА не исключает использования других лекарственных препаратов.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений не наблюдается.

17. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

18. Применение препарата не исключает использования других лекарственных средств и (или) кормов.

19. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата при курсе применения, предусмотренного схемой лечения. При случайном увеличении интервала между обработками применение препарата возобновляют в той же дозе по той же схеме.

21. Продукцию животного происхождения во время и после применения Х-ГИА разрешается использовать без ограничений.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.	ООО «МНПК БИОТЕХИНДУСТРИЯ» 170006 РФ г.Тверь, набережная реки Тьмаки, д.18
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.	ООО «МНПК БИОТЕХИНДУСТРИЯ» 109147 РФ г.Москва, ул.Марксистская. д.34, кор.10, пом.20, эт.6