

19.02.2020

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Эквисект[®] паста

(организация-разработчик: ООО НБЦ «Фармбиомед»,
117192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 12, к. 1, к.п.)

Номер регистрационного удостоверения:
77-3-16.12-3275 №ПВР-3-1.0/00417

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: Эквисект[®] паста (Equisect pasta);
международное непатентованное наименование действующего вещества: аверсектин сектин.
2. Лекарственная форма: паста для перорального применения.
Эквисект[®] паста в качестве действующего вещества в 1 г содержит аверсектин С – 10 мг, а также вспомогательные вещества: полиэтиленоксид-1500, глицерин, спирт бензиловый, поливинилпирролидон, полиэтиленоксид-400.
3. По внешнему виду препарат представляет собой однородную пастообразную массу светло-коричневого цвета.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 3 года со дня производства.
Запрещается применение Эквисект[®] пасты по истечении срока годности.
4. Выпускают Эквисект[®] пасту в полимерных шприцах-дозаторах, расфасованной по 14 г.
5. Хранят Эквисект[®] пасту в закрытой упаковке производителя в защищённом от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, вдали от нагревательных приборов и источников огня, при температуре от 0°C до 25°C.
6. Эквисект[®] пасту следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. Эквисект[®] паста относится к фармакотерапевтической группе – противопаразитарные средства.
10. Входящий в состав препарата аверсектин С обеспечивает его широкий спектр действия в отношении имагинальных и личиночных фаз развития нематод, вшей, кровососок, личинок носоглоточных, желудочных оводов, паразитирующих у лошадей.

Аверсектин С, входящий в состав препарата, - соединение класса макроциклических лактонов. Механизм действия заключается в его влиянии на величину тока ионов хлора через мембраны нервных и мышечных клеток паразита. Основной мишенью являются глутаматчувствительные хлорные каналы, а также рецепторы гамма-аминомасляной кислоты. Изменение тока ионов хлора нарушает проведение нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели паразита.

Максимальная концентрация аверсектина С в плазме крови лошадей отмечается через 5 часов после перорального введения Эквисект® пасты и сохраняется на терапевтическом уровне в течение 7-10 суток. Выводится из организма аверсектин С в основном в неизмененном виде с фекалиями и мочой, у лактирующих кобыл также частично с молоком.

Эквисект® паста по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, резорбтивно-токсического, сенсибилизирующего, эмбриотоксического, тератогенного и мутагенного действия. Хорошо переносится лошадьми разных пород и возраста.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Эквисект® пасту применяют лошадям для лечения и профилактики стронгилидозов, трихонематидозов (циатостоминозов), оксиуроза, пробстмауриоза, параскаридоза, стронгилоидоза, трихостронгилеза, диктиокаулеза, парафиляриоза, сетариоза, онхоцеркоза, габронемагоза, драйшиоза, а также гастрофилеза и ринэстроза.

12. Противопоказанием к применению Эквисект® пасты является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата (в том числе в анамнезе). Эквисект® пасту не следует применять истощенным, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным.

13. При работе с Эквисект® пастой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы с лекарственным препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Эквисект® пастой. Обработку животных следует проводить в резиновых перчатках. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, необходимо немедленно промыть большим количеством воды.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению лекарственного препарата или этикетку).

Запрещается использовать пустые шприцы-дозаторы из-под препарата для бытовых целей, их помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

14. Не подлежат обработке беременные, а также дойные кобылы, молоко которых используют в пищевых целях, и жеребята массой менее 100 кг.

15. Эквисект® пасту применяют лошадям однократно перорально из расчета 2 г на 100 кг массы животного (0,2 мг/кг по ДВ).

Пасту выдавливают на корень языка из шприца-дозатора, который вводят в межзубное пространство ротовой полости и затем на несколько секунд приподнимают голову животного в целях предотвращения ее вытекания.

Рассчитанный на массу лошади объем пасты устанавливают перемещением фиксатора по штоку и фиксацией соответствующей дозы. Каждое деление шприца соответствует 2 г пасты.

С лечебно-профилактической целью при нематодозах и оводовых инвазий взрослых лошадей и подсосных жеребят Эквисект® пасту применяют в терапевтической дозе под контролем ово- и лярвоскопии согласно рекомендациям, представленным соответственно в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Схема применения Эквисект® пасты взрослым лошадям при нематодозах и оводовых инвазиях

Показания	Сроки обработки
Стронгилидозы	В пастбищный период не реже 1 раза в 2 месяца
Трихостронгилез, диктиокаулез	В пастбищный период 2 раза весной и осенью
Параскаридоз, оксиуроз	В стойловый период 1 раз в 2 месяца
Габронематоз, драйшиоз	По показаниям весной, летом и осенью
Парафиляриоз, сетариоз, онхоцеркоз	Для профилактики в стационарно неблагополучных хозяйствах 1 раз в месяц в период лета насекомых
Гастрофилез, ринэстроз	По показаниям в пастбищный период 1 раз в 2 месяца

Таблица 2

Схема применения Эквисект® пасты подсосным жеребят при нематодозах и оводовых инвазиях

Показания	Сроки обработки
Стронгилидоз	1 раз в месяц
Пробстмауриоз	По показаниям гельминтоскопии, однократно
Параскаридоз	С 2-3-месячного возраста 1 раз в месяц
Трихонематидозы (циатостоминозы)	С 3-месячного возраста до отъема 1 раз в 2 месяца
Гастрофилез, ринэстроз	По показаниям в пастбищный период 1 раз в 2 месяца

Перед массовыми обработками каждую серию препарата испытывают на небольшой группе малоценных лошадей (5-7 голов) разного возраста и массы. При отсутствии в течение 3 дней осложнений приступают к обработке всего поголовья.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Эквисект® пасты в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. После применения препарата при сетариозе и онхоцеркозе возможен отек межжелюстного пространства, подгрудка, подбрюшья, мошонки, который проходит самопроизвольно в течение 1-3^x суток. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении аллергических реакций его дальнейшее использование прекращают и назначают животному десенсибилизирующую терапию.

17. При значительной передозировке Эквисект® пасты у животного может наблюдаться слабость, саливация, тремор. Специфические средства детоксикации от-

сутствуют, применяют общие меры, направленные на выведение лекарственного препарата из организма.

18. Эквисект[®] пасту не следует применять совместно с авермектинсодержащими и другими противопаразитарными лекарственными препаратами для обработки лошадей, в связи с возможным взаимным усилением токсичности.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении или отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений схемы применения Эквисект[®] пасты, так как это может привести снижению эффективности препарата. В случае пропуска очередной обработки ее следует провести как можно скорее в той же дозе.

21. Убой лошадей на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток после применения Эквисект[®] пасты. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «Фармбиомедсервис», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12а, к.4.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «Фармбиомедсервис», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12а, к.4

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Эквисект[®] пасты, согласованная Россельхознадзором 04.07.2016 г.