

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

25.08.2021

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
Гельминтал С

(организация-разработчик: Neoterica GmbH, Grillostr. 18, 45141, Essen, Germany /
Неотерика ГмбХ, Грилло штр. 18, 45141, Эссен, Германия)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-4.17-3704№ПВР-3-24.12/02854

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: Гельминтал С (Gelmintal С);
международное непатентованное наименование: моксидектин, празиквантел.
2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.
Гельминтал С в 1 мл в качестве действующих веществ содержит
моксидектин – 2,5% и празиквантел – 4,0%, а также вспомогательные вещества:
спирт изопропиловый, полиэтиленгликоль и диметилсульфоксид.
3. Гельминтал С по внешнему виду представляет собой прозрачную от
бесцветного до светло-желтого цвета маслянистую жидкость.
Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 3 года со дня
производства. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.
4. Выпускают Гельминтал С расфасованным в полимерные пипетки по 0,5
мл (для щенков и собак менее 10 кг) и 2,5 мл (для собак более 10 кг). Пипетки
поштучно упаковывают в полимерные блистеры и помещают по 2 блистера вместе
с инструкцией по применению в картонные пачки.
5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от
прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при
температуре от 0 °С до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 60%.
6. Гельминтал С следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с
требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Гельминтал С относится к фармакотерапевтической группе: комбинированные противопаразитарные лекарственные препараты.

10. Комбинация моксидектина и празиквантела, входящих в состав препарата, обеспечивает широкий спектр его противопаразитарного действия, в том числе против личиночных и половозрелых фаз развития кишечных нематод, включая *Toxocara canis*, *Toxascaris leonine*, *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Angiostrongylus vasorum*, *Crenosoma vulpis*, личинок (микрофилярий) *Dirofilaria immitis*, цестод *Echinococcus granulosus*, *Dipylidium caninum*, *Taenia taeniaformis*, демодекозных (*Demodex canis*) и саркоптоидных (*Sarcoptes scabiei*, *Otodectes cynotis*) клещей, блох (*Ctenocephalides canis*), вшей (*Linognathus setosus*) и власоедов (*Trichodectes canis*), паразитирующих у собак.

Моксидектин - полусинтетическое соединение группы милбемицинов (макроциклические лактоны). Активен в отношении личинок и имаго нематод, насекомых и саркоптоидных клещей. Оказывает стимулирующее действие на выделение гамма-аминомасляной кислоты, повышает проницаемость мембран для ионов хлора, что подавляет электрическую активность нервных клеток, вызывая нарушение мышечной иннервации, паралич и гибель нематод и эктопаразитов.

Празиквантел – соединение группы пиразинизохинолинов, обладает выраженным действием против половозрелых и неполовозрелых цестод; механизм его действия основан на индуцировании распада тегумента и ингибировании фумаратредуктазы, стойкой деполяризации мышечных клеток гельминта, нарушении энергетического обмена, что вызывает паралич и гибель цестод и способствует их выведению из желудочно-кишечного тракта.

Максимальные концентрации празиквантела и моксидектина при наружном применении отмечаются в крови собак через 2-4 суток; выводятся соединения из организма в основном с мочой в неизменном виде и частично в метаболизированной форме в течение 28-30 суток.

Гельминтал С по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 при пероральном введении относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности), при накожном нанесении - к малоопасным веществам (4 класс опасности), обладает слабо выраженными кумулятивными свойствами, в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, эмбриотоксического, тератогенного и мутагенного действия. Препарат хорошо переносится собаками разного возраста и пород; токсичен для пчел, а также рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. Гельминтал С назначают собакам с лечебной и профилактической целью при кишечных нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, анкилостомоз), цестодозах (тениидозы, дипилидиоз, эхинококкоз), энтомозах, вызванных блохами, вшами и власоедами, демодекозе, отодектозе и саркоптозе, а также в целях профилактики диروفилариоза.

12. Противопоказанием к применению Гельминтала С является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата, в том числе в анамнезе, выраженные нарушения функции почек и печени. Не подлежат

обработке истощенные и больные инфекционными болезнями животные и собаки массой менее 1 кг.

13. При работе с Гельминталом С следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Во время работы с препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Не следует гладить места нанесения препарата и подпускать животное к маленьким детям в течение 24 часов после обработки Гельминталом С. Запрещается использовать пустые пипетки и картонные пачки из-под лекарственного препарата для бытовых целей. Их помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Гельминталом С. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Не подлежат обработке щенные и кормящие суки, щенки моложе 7-недельного возраста. При необходимости обработку щенков породы колли, бобтейл и шелти, а также щенных и кормящих сук следует проводить после консультации с ветеринарным врачом.

15. Препарат применяют животным путем капельного («spot-on») нанесения на сухую неповрежденную кожу. Перед использованием у пипетки отламывают верхнюю часть и, раздвинув шерсть, наносят препарат животному на кожу в места, недоступные для слизывания - между лопатками у основания шеи. При обработке крупных собак содержимое пипеток наносят на кожу в 3 - 4 точки. Минимальная терапевтическая доза Гельминтала С составляет 0,1 мл/кг массы животного (соответственно 4 мг/кг празиквантела и 2,5 мг/кг моксидектина).

В зависимости от массы животного используют Гельминтал С различной фасовки в дозах, указанных в таблице:

Масса животного	Маркировка пипетки	Доза препарата, мл	Доза действующих веществ, мг на 1 кг массы животного	
			празиквантел	моксидектин
от 2 до 5 кг	для собак массой до 10 кг	0,5 (1 пипетка по 0,5 мл)	4 - 10	2,5 - 6,25
от 5,1 до 10 кг	для собак массой до 10 кг	1,0 (2 пипетки по 0,5 мл)	4 - 8	2,5 - 5,0
от 10,1 до 25 кг	для собак массой более 10 кг	2,5 (1 пипетка по 2,5 мл)	4 - 10	2,5 - 6,25
от 25,1 до 50 кг	для собак массой более 10 кг	5,0 (2 пипетки по 2,5 мл)	4 - 8	2,5 - 5,0

При обработке собак массой более 50 кг препарат применяют в дозе 0,1 мл на каждый кг массы животного, используя комбинации пипеток различной фасовки.

Для уничтожения блох, вшей и власоедов обработку животных проводят однократно, для предотвращения повторной инфекации - один раз в 4 - 6 недель на протяжении всего сезона активности насекомых.

Для лечения отодектоза (ушной чесотки) препарат применяют наружно однократно. В процессе лечения рекомендуется очищать слуховой проход от экссудата и струпьев, а в случае осложнения отитом, назначать противомикробные и противовоспалительные средства. При необходимости курс лечения повторяют через 1 месяц.

С лечебной целью при саркоптозе Гельминтал С применяют 2-кратно, при демодекозе - 2-4-кратно с интервалом 28 дней; в целях профилактики возможной инвазии - 1 раз месяц.

Лечение демодекоза рекомендуется проводить комплексно с применением этиотропных, патогенетических и симптоматических лекарственных средств.

Для дегельминтизации животных при нематодозах и цестодозах желудочно-кишечного тракта препарат применяют с лечебной целью однократно, с профилактической - один раз в месяц.

С целью профилактики дирофиляриоза в неблагополучных по заболеванию регионах Гельминтал С применяют в весенне-летне-осенний период: перед началом лета комаров и москитов (переносчиков возбудителя *D. immitis*) однократно, затем один раз в месяц и последний раз в сезоне не ранее, чем за 1 месяц после завершения лета насекомых. Гельминтал С не уничтожает половозрелых дирофилярий, но снижает количество циркулирующих в крови микрофилярий и может быть применен без опасений также и инвазированным животным.

Препарат не следует наносить на влажную или поврежденную кожу и мыть и купать животное в водоемах в течение 4 суток после обработки препаратом.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Гельминтала С в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В редких случаях возможны индивидуальные реакции кожи (покраснение, зуд), которые самопроизвольно проходят и не требуют применения лекарственных средств. В случае проявления аллергических реакций у чувствительного к компонентам препарата животного, препарат следует тщательно смыть водой с моющим средством и ополаскивают шерсть большим количеством проточной воды, а при необходимости назначить антигистаминные и симптоматические средства.

17. При передозировке препарата у животного может наблюдаться слабость, тремор, саливация. В этом случае препарат тщательно смывают водой с моющим средством и применяют общие меры, направленные на его выведение из организма.

18. Не следует применять Гельминтал С совместно с препаратами, содержащими макроциклические лактоны, и другими противопаразитарными средствами для обработки животных.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении или его отмене не выявлено.

20. При проведении дегельминтизации следует придерживаться рекомендуемых инструкцией сроков. В случае пропуска очередной обработки применение препарата возобновляют в той же дозировке по той же схеме.

21. Гельминтал С не предназначен для применения продуктивным животным.

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Гельминтал С, согласованная Россельхознадзором 27.12.2019 года.

Наименование производственной производителя препарата	и адрес площадки лекарственного препарата	АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23
Наименование и уполномоченной владелец удостоверения препарата на пользователя	и адрес организации, держателем или регистратором лекарственного препарата на принятие претензий от пользователя	АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263