

30.07.2021

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
Форвет® капли глазные 0,004 %

(организация-разработчик: ООО «Национальная Исследовательская
Компания»,
301404, Тульская обл., Суворовский р-н, д. Варушицы, д. 104)

Номер регистрационного удостоверения 50-3-2.21-4729№ПВР-3-14.15/03252

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Форвет® капли глазные 0,004 %.

Международное непатентованное наименование действующего вещества: таурин.

Группировочное название: полисахариды побегов *Solanum tuberosum*.

2. Лекарственная форма: капли глазные.

Форвет® капли глазные 0,004 % в качестве действующих веществ в 1 мл содержат Панавир® (полисахариды побегов *Solanum tuberosum*) - 0,04 мг и таурин - 4,0 мг, а в качестве вспомогательных веществ: нипагин, натрия хлорид и воду очищенную.

3. Препарат по внешнему виду представляет собой прозрачную или слегка опалесцирующую бесцветную или со светло-коричневым оттенком жидкость.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года со дня производства, после первого вскрытия флакона-капельницы или флакона - 30 суток.

Запрещается применение Форвет® капель глазных 0,004 % по истечении срока годности.

4. Форвет® капли глазные 0,004 % выпускают расфасованными по 5 или 10 мл в стерильные полимерные флаконы-капельницы, укупоренные полимерными пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми или в стерильные стеклянные флаконы Schott FIOLAX clear, укупоренные

бромбутиловыми резиновыми пробками с обкаткой алюминиевыми колпачками.

Каждый флакон-капельницу или флакон и крышку-капельницу помещают в индивидуальную пачку из картона вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя отдельно от продуктов питания и кормов, в защищённом от света месте, при температуре от 2 °С до 25 °С.

6. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускают без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Форвет® капли глазные 0,004 % относятся к группе «Другие иммуномодуляторы в комбинациях».

10. Входящий в состав капель глазных Панавир® – очищенный экстракт побегов картофеля (*Solanum tuberosum*) - представляет собой полисахаридный комплекс класса гексозных гликозидов, в состав которого входят: рамноза (2-10 %), арабиноза (3-15 %), глюкоза (10-67 %), галактоза (2-27 %), ксилоза (0,1-3 %), манноза (0,1-5 %), уроновые кислоты (2-5 %). Панавир® обладает цитопротективным действием, индуцирует синтез интерферона, тормозит репликацию вирусов в инфицированных клетках, что приводит к существенному снижению инфекционной активности вирусов и повышению жизнеспособности инфицированных клеток.

Таурин – серосодержащая аминокислота, образующаяся в организме в процессе метаболизма цистеина, стимулирует процессы репарации и регенерации при заболеваниях дистрофического характера и заболеваниях, сопровождающихся резким нарушением метаболизма тканей глаза. Способствует нормализации функций клеточных мембран, активизации энергетических и обменных процессов, сохранению электролитного состава цитоплазмы за счет накопления K^+ и Ca^{2+} , улучшения условий проведения нервного импульса.

При применении Форвет® капель глазных 0,004 % улучшается регенерация тканей глаза при инфекционных заболеваниях конъюнктивы и роговицы.

Форвет® капли глазные 0,004 % по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают местно-раздражающего действия.

III. Порядок применения

11. Форвет® капли глазные 0,004 % назначают собакам и кошкам в составе комплексной терапии инфекционных заболеваний конъюнктивы и роговицы.

12. Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животных к его компонентам.

13. При работе с Форвет® каплями глазными 0,004 % следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для работы с лекарственными препаратами.

Во время работы с лекарственным препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

Пустые флаконы-капельницы, стеклянные флаконы и крышки-капельницы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Форвет® каплями глазными 0,004 %. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Форвет® капли глазные 0,004 % без консультации с лечащим ветеринарным врачом не следует применять беременным и лактирующим самкам.

15. Форвет® капли глазные 0,004 % применяют путем инстилляций в конъюнктивальный мешок по 1 капле 4-5 раз в день в течение 7-30 дней.

При тяжелом патологическом процессе (язвенные кератиты, эрозия роговицы, септическая язва роговицы, катаральный и гнойный конъюнктивит) Форвет® капли глазные 0,004 % применяют совместно с препаратом Форвет® раствор для инъекций в соответствии с инструкцией по применению.

Продолжительность курса лечения определяет ветеринарный врач, в зависимости от тяжести клинического состояния животного.

16. При применении Форвет® капель глазных 0,004 % в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности и появлении аллергических реакций применение препарата прекращают и при необходимости назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

18. Применение Форвета® капель глазных 0,004 % не исключает использования других лекарственных препаратов этиотропной и симптоматической терапии.

19. Особенности действия при первом применении лекарственного препарата и его отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата Форвет® капель глазных 0,004 %, поскольку это может привести к снижению его терапевтической эффективности. При пропуске одной или нескольких доз

лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить в предусмотренной дозе и схеме применения.

21. Форвет® капли глазные 0,004 % не предназначены для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения

ООО «Т-Хелпер КТ», 105318,
г. Москва, Измайловское шоссе, д. 28,
этаж 4

ООО «Фарма Ген», 194064, Россия,
г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр-т,
д. 4, литер А

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя

ООО «Национальная
Исследовательская Компания»,
301404, Россия, Тульская область,
Суворовский р-н, д. Варушицы,
д. 104, тел.: 8-800-555-222-9.