

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата Цестал Плюс со вкусом печени  
для лечения и профилактики гельминтозов у собак

(организация-разработчик: «CEVA Sante Animale», Франция)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Цестал Плюс со вкусом печени (Cestal Plus flavour).

Международное непатентованное наименование: празиквантел, пирантела эмбонат, фенбендазол.

2. Лекарственная форма: таблетки для перорального применения.

Цестал Плюс со вкусом печени в качестве действующих веществ в одной таблетке содержит: празиквантел - 50 мг, пирантела эмбонат - 144 мг, фенбендазол - 200 мг, а также вспомогательные компоненты: лактозу - 150 мг, пшеничный крахмал - 110 мг, повидон К-90 - 4 мг, тальк - 10 мг, стеарат магния - 12 мг, крахмалистый гликолят натрия - 14 мг, сухие дрожжи - 70 мг, добавку со вкусом печени - 6 мг (мальтодекстрин, пальмовое масло, крахмал - E1450 и альфа-токоферол - E307).

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой круглые плоские таблетки от светло-желтого до серо-коричневого цвета с разделительной бороздкой посередине. Масса одной таблетки 770 мг.

3. Выпускают препарат расфасованным по 2 таблетки в блистерах из алюминиевой фольги и прозрачной полиэтиленовой пленки, которые упаковывают в картонные коробки по 5 блистеров в каждой, вместе с инструкцией по применению.

4. Хранят Цестал Плюс со вкусом печени в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 15°C до 25°C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года с даты производства. Запрещается применять лекарственный препарат по истечении срока его годности.

5. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

### II. Фармакологические свойства

7. Цестал Кэт со вкусом печени относится к антигельминтным комбинированным лекарственным препаратам.

Празиквантел, входящий в состав лекарственного препарата, активен против цестод (*Taenia* spp., *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus*). Механизм его действия заключается в повышении проницаемости клеточных мембран гельминта для ионов кальция, что вызывает генерализованное сокращение мускулатуры паразита, переходящее в стойкий паралич, ведущий к гибели гельминта. Одновременное образование вакуолей в поверхностном слое члеников паразита, способствующее их разрушению.

Празиквантел быстро и почти полностью всасывается в кишечнике, хорошо распределяется в большинстве органов, выводится с мочой в метаболизированной форме.

Пирантел эмбонат обладает широким антигельминтным спектром действия против нематод, включая *Toxocara cati*, *Toxascaris leonine*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*. Он вызывает необратимый паралич и контрактуру мышц паразита.

Механизм действия пирантела эмбоната заключается в блокировании нейромышечной передачи, нарушении проницаемости клеточных мембран и угнетении холинэстеразы, что приводит к параличу и гибели паразита. Максимальная концентрация пирантела эмбоната в плазме крови отмечается через 2-4 часа. Выводится пирантел эмбонат из организма с фекалиями и мочой в течение 24 часов.

Фенбендазол обладает широким антигельминтным спектром действия против нематод. Механизм его действия заключается в ингибировании фумаратредуктазной ферментной системы паразита, приводящей к нарушению энергетического метаболизма и гибели гельминта.

Фенбендазол слабо всасывается в кишечнике, метаболизируется до сульфоксида и сульфона, достигая максимальных концентраций в плазме крови через 12-15 часов, выводится, главным образом, с фекалиями.

Цестал Плюс со вкусом печени по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007). В рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического и тератогенного действия. Хорошо переносится собаками разных пород.

### Ш. Порядок применения

8. Цестал Плюс со вкусом печени применяют собакам с профилактической и лечебной целью при нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, анкилостоматоз, трихоцефалез) и цестодозах (дипилидиоз, дифиллоботриоз, эхинококкоз, тениидозы).

9. Противопоказанием к применению Цестала Плюс со вкусом печени является индивидуальная повышенная чувствительность собак к компонентам лекарственного препарата, а также возраст щенков менее 3 недель.

10. Цестал Плюс со вкусом печени назначают перорально индивидуально в следующих дозах для собак массой:

- до 2 кг – ¼ таблетки
- от 2 до 5 кг – ½ таблетки
- от 5 до 10 кг – 1 таблетка
- от 10 до 20 кг – 2 таблетки
- от 20 до 30 кг – 3 таблетки
- от 30 до 40 кг – 4 таблетки
- свыше 40 кг – 5 таблеток.

Цестал Плюс со вкусом печени дают животным однократно с кормом, или вводят принудительно: на корень языка или в виде водной суспензии с помощью шприца (предварительно смешав растолченную таблетку с водой).

Предварительной голодной диеты или применения слабительных средств не требуется.

С лечебной целью собак дегельминтизируют по показаниям, с профилактической ежеквартально в указанных дозах.

Дегельминтизацию щенков проводят с трехнедельного возраста.

11. Симптомов передозировки не установлено. Препарат хорошо переносится животными и не обладает токсическим действием даже при пятикратном превышении терапевтической дозы.

12. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении или отмене не установлено.

13. Лекарственный препарат предназначен для однократного применения.

14. Побочных явлений и осложнений при применении препарата Цестал Плюс со вкусом печени в соответствии с инструкцией по применению не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные препараты или другое симптоматическое лечение.

15. Запрещается использовать лекарственный препарат совместно с пиперазином.

16. Цестал Плюс со вкусом печени не предназначен для лечения продуктивных животных.

#### IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Цесталом Плюс со вкусом печени следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

18. Людям с повышенной чувствительностью к компонентам препарата Цестал Плюс следует избегать прямого контакта с препаратом.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: «ЛАВЕТ Фармасьютикалс Со. Ltd.»/«LAVET Pharmaceuticals Co Ltd.», Венгрия, 1161, Budapest, Otto u.14, Hungary

Адрес места производства: «ЛАВЕТ Фармасьютикалс Со. Ltd.»/«LAVET Pharmaceuticals Co Ltd.», Венгрия, 1161, Budapest, Otto u.14, Hungary

Инструкция разработана ООО «Сева Санте Анималь»; Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 16; тел. (495) 729-59-90.

С утверждением настоящей инструкции, утрачивает силу Инструкция по применению, утвержденная Россельхознадзором 15 декабря 2008 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер: ПВИ-2-8.8./02603