

1

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

21.04.2025

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Дезацид Форте

(Организация-разработчик: ООО «Агробиоснаб»,
105064, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный,
ул. Казакова, д.6, стр. 1)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-07.25-5306№ПВР-3-07.25/04070

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Дезацид Форте (Dezacid Forte).

Международное непатентованное наименование: неомицин, полимиксин В, декспантенол.

2. Лекарственная форма: капли глазные и интраназальные.

Лекарственный препарат Дезацид Форте содержит в 1 мл в качестве действующих веществ: неомицина сульфат – 5 мг, полимиксина В сульфат – 0,6 мг, декспантенол - 15 мг.

В качестве вспомогательных веществ лекарственный препарат содержит: гиалуронат натрия (гиалуроновую кислоту), янтарную кислоту, натрия хлорид, трилон Б, хлористоводородной кислоты раствор 1 М, натрия гидроксида раствор 1 М, полиэтиленгликоль (ПЭГ-400), воду очищенную.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.

1

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года с даты производства, после первого вскрытия флакона-капельницы - не более 25 суток.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат Дезацид Форте выпускают расфасованным по 10 мл в полимерные флаконы-капельницы соответствующей вместимости, герметично укупоренные навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия. Флаконы-капельницы упаковывают в индивидуальные картонные пачки.

Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 25°C.

6. Лекарственный препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается по рецепту на лекарственный препарат или требованию ветеринарной организации.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Лекарственный препарат Дезацид Форте относится к фармакотерапевтической группе: полимиксины (полипептиды) в комбинациях.

10. Лекарственный препарат обладает широким спектром антимикробной активности, оказывает противовоспалительное и регенерирующее действие.

Неомицина сульфат оказывает бактерицидное действие, нарушая синтез белка в бактериальной клетке. Активен в отношении *Staphylococcus aureus*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Streptococcus viridans*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus vulgaris*, *Aerobacter aerogenes*, *Haemophilus influenzae*. При воспалительных заболеваниях кожи или нарушении целостности кожного покрова неомицин всасывается через кожу и быстро выводится почками в активной форме.

Полимиксина В сульфат вызывает нарушение целостности цитоплазматической мембраны бактериальной клетки и оказывает

бактерицидное действие на грамотрицательные бактерии, включая *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Klebsiella* spp., *Pseudomonas* spp., *Enterobacter* spp.

Декспантенол является предшественником пантотеновой кислоты, которая превращается в организме в кофермент А и участвует во многих процессах метаболизма. Способствует увеличению пролиферации фибробластов и улучшает регенерацию тканей.

При местном применении лекарственного препарата системная абсорбция действующих веществ низкая.

Лекарственный препарат Дезацид Форте по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Лекарственный препарат Дезацид Форте применяют собакам и кошкам для лечения воспалительных заболеваний глаз (блефариты, конъюнктивиты, дакриоциститы, кератиты, кератоконъюнктивиты, иридоциклиты, язвы роговицы) и носа (риниты), вызванных патогенными микроорганизмами, чувствительными к действующим веществам препарата; для предотвращения развития вторичной бактериальной микрофлоры при вирусных заболеваниях глаз и носа, травмах и хирургических вмешательствах в послеоперационном периоде.

Лекарственный препарат Дезацид Форте применяют также для санации и обеззараживания ран конъюнктивы, век, крыльев носа, носовых ходов.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам (в том числе в анамнезе).

13. При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для ветеринарного применения. По окончании работы следует вымыть руки тёплой водой с мылом.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с ним. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки глаз их необходимо промыть большим количеством воды. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании компонентов лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Запрещается применение лекарственного препарата самкам во время беременности и в период лактации.

Потомству животных в возрасте до 1 месяца лекарственный препарат следует применять с осторожностью, под контролем ветеринарного специалиста.

15. Перед применением флакон-капельницу с препаратом Дезацид Форте следует тщательно встряхнуть.

Провести гигиеническую обработку, очищая область вокруг глаз и/или носа животного тампоном, смоченным небольшим количеством лекарственного препарата.

Для лечения бактериальных инфекций глаз и носа, а также для предотвращения развития вторичной бактериальной микрофлоры при вирусных заболеваниях глаз и носа, травмах и хирургических вмешательствах в послеоперационном периоде лекарственный препарат Дезацид Форте закапывают в конъюнктивальную полость, в оба глаза, или в нос, в оба носовых хода, по 2-3 капли 3-4 раза в сутки в течение 5-14 дней.

С целью санации и обеззараживания ран конъюнктивы и век проводят обработку повреждённой области стерильной марлевой салфеткой, смоченной лекарственным препаратом, 1 раз в день, в течение 5-14 дней.

16. Побочных явлений и осложнений у животных при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

При индивидуальной повышенной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций применение лекарственного препарата Дезацид Форте следует прекратить и назначить животному симптоматическую терапию.

17. Симптомы передозировки лекарственного препарата у животных не установлены.

18. Сведения о взаимодействии лекарственного препарата с другими препаратами, применяемыми в ветеринарии, отсутствуют. В случае использования с другими местными офтальмологическими препаратами интервал между их применением должен составлять не менее 10 минут.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении или отмене не установлено.

20. Следует избегать нарушений доз и схемы применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его терапевтической

эффективности. В случае пропуска очередного применения лекарственного препарата его следует применить как можно быстрее в той же дозе и по той же схеме.

21. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса
производственных площадок
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

ООО «Агробiosoнаб»,
143985, Московская область,
Балашиха, Полтевское шоссе,
владение 4.

АО «АгробioпроM»,
143985, Московская область,
Балашиха, Полтевское шоссе,
владение 4.

Наименование, адрес
организации, уполномоченной
держателем или владельцем
регистрационного удостоверения
лекарственного препарата на
принятие претензий от
потребителя.

ООО «Агробiosoнаб»,
РФ, 105064, город Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Басманный,
ул. Казакова, д.6, стр. 1.

Генеральный директор
ООО «Агробiosoнаб»



В.И. Чупахин