

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Н. А. ВЛАСОВ  
14.08.2019

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению вакцины Эурикан DHPPI<sub>2</sub> – LR

(Организация-разработчик: «Мериал», 29 авеню Тони Гарнье, 69007, Лион, Франция /  
«Merial», 29 avenue Tony Garnier, 69007, Lyon, France)

Номер регистрационного удостоверения: *250-1-20.12-4543/1764-1-5.1/00938*

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Эурикан DHPPI<sub>2</sub> – LR (Eurican DHPPI<sub>2</sub> – LR).

Международное непатентованное наименование: Вакцина против чумы, аденовириозов, парвовириоза, парагриппа-2, лептоспироза и бешенства собак.

2. Лекарственная форма: сухой компонент (Эурикан DHPPI<sub>2</sub>) – лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций; жидкий компонент (Эурикан-LR) – суспензия для инъекций.

Сухой компонент (Эурикан DHPPI<sub>2</sub>) изготовлен из культуральных жидкостей клеточных культур, инфицированных аттенуированными штаммами вируса чумы плотоядных (штамм BA5), аденовируса CAV 2 (штамм DK13), парвовируса (штамм CAG2) и вируса парагриппа-2 собак (штамм CGF 2004/75), с добавлением в качестве стабилизаторов полипептидов (22,5 мг/доза) и глюкоидов (77,5 мг/доза).

Жидкий компонент (Эурикан-LR) изготовлен из суспензии лептоспир серогрупп *Leptospira icterohaemorrhagiae* (штамм 16069) и *Leptospira canicola* (штамм 16070), инактивированных тиомерсалом, гликопротеинов вируса бешенства (штамм G52), с добавлением алюминия гидроксида (0,6 мг) в качестве адьюванта.

3. По внешнему виду сухой компонент представляет собой сухую однородную пористую массу от бежевого до светло-желтого цвета, жидкий компонент – бесцветную жидкость с белым осадком, образующим при взбалтывании однородную взвесь.

Срок годности вакцины 24 месяца с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. После вскрытия флакона вакцину необходимо использовать немедленно. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.

4. Сухой компонент расфасован по 1 иммунизирующей дозе (1 см<sup>3</sup>), жидкий компонент – по 1 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, герметично закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

Флаконы с компонентами вакцины упакованы в пластиковые коробки по 10 иммунизирующих доз (10 флаконов сухого компонента и 10 флаконов жидкого компонента). В каждую коробку с вакциной вложена инструкция по применению.

5. Вакцину хранят при температуре от 2 до 8°C, в защищенном от света месте.

6. Вакцину хранить в недоступном для детей месте.

7. Компоненты вакцины во флаконах без маркировки, с нарушением целостности и/или герметичности упаковки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонней примеси, с истекшим сроком годности, не использованные сразу после вскрытия, бракуют и обеззараживают путем кипячения в течение 30 минут.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Вакцина отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Биологические свойства

9. Вакцина Эурикан DHPPI<sub>2</sub> – LR - иммунобиологический лекарственный препарат.

10. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у собак против возбудителей чумы плотоядных, инфекционного гепатита и инфекционного ларинготрахеита, парвовируса, парагриппа – 2, лептоспироза и бешенства через 14 дней после вакцинации, продолжительностью не менее 12 месяцев.

В одной иммунизирующей дозе (1 мл) содержится не менее  $10^{4,0}$ CCID<sub>50</sub> аттенуированного вируса чумы (штамм ВА5); не менее  $10^{2,5}$ CCID<sub>50</sub> аттенуированного аденовируса CAV 2 (штамм DK13); не менее  $10^{4,9}$ CCID<sub>50</sub> аттенуированного парвовируса (штамм CAG2); не менее  $10^{4,7}$ CCID<sub>50</sub> аттенуированного вируса парагриппа собак типа 2 (штамм CGF 2004/75), инактивированные *Leptospira canicola* (штамм 16070) и *Leptospira icterohaemorrhagiae* (штамм 16069); не менее 1 IU гликопротеинов вируса бешенства (штамм G52).

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

## III. Порядок применения

11. Вакцина предназначена для иммунизации собак против чумы, инфекционного гепатита и инфекционного ларинготрахеита, парвовируса, парагриппа-2, лептоспироза и бешенства.

12. Запрещено иммунизировать клинически больных и/или ослабленных животных

13. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть в спецодежде и обеспечены индивидуальными средствами защиты. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством водопроводной воды. При случайном введении препарата человеку, место введения необходимо обработать 70 % раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

14. Запрещено иммунизировать беременных сук после первой трети беременности.

15. Вакцинации подлежат собаки, начиная с 12-недельного возраста. Вакцину вводят подкожно однократно за 3-5 недель до или после введения вакцины Эурикан DHPPI<sub>2</sub>– L, в дозе 1 мл независимо от массы тела и породы собаки.

Ревакцинацию проводят ежегодно в той же дозе.

При вакцинации необходимо соблюдать правила асептики и антисептики. Перед применением содержимое флакона с жидким компонентом взбалтывают и вносят во флакон с лиофилизированным компонентом, тщательно перемешивают до полного растворения сухого компонента. Для вакцинации используют стерильные шприцы и иглы.

16. На месте инъекции возможно появление быстро исчезающей припухлости. При возникновении анафилактической реакции проводят симптоматическое лечение.

17. Симптомов проявления чумы, аденовириозов, парвовируса, парагриппа-2, лептоспироза и бешенства собак или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

18. Не допускается применение вакцины Эурикан DHPPI<sub>2</sub>– LR одновременно с другими вакцинами и препаратами других групп.

19. Особенности поствакцинальной реакции при первичной и последующих иммунизациях не установлено.

20. Следует избегать нарушений схемы проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики чумы, аденовириозов, парвовируса, парагриппа-2, лептоспироза и бешенства собак. В случае пропуска очередного введения необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

21. Сроки возможного использования продукции животного происхождения после введения вакцины Эурикан DHPPI<sub>2</sub>– LR не устанавливаются.

Наименования и адреса  
производственных площадок  
производителя лекарственного препарата  
для ветеринарного применения

«Мериал», ру де л'Авиасьон, 69800 Сан  
Прист, Франция /  
«Merial», rue de l'Aviation, 69800 Saint  
Priest, France;

«Мериал», Шеми де Крузоль, 69210  
Лентили, Франция /  
«Merial», Chemin de Cruzols, 69210  
Lentilly, France;

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной держателем или  
владельцем регистрационного  
удостоверения лекарственного препарата  
на принятие претензий от  
потребителя/Импортер

ООО «Берингер Ингельхайм»,  
Российская Федерация,  
125171, Москва, Ленинградское шоссе,  
16А, стр.3

Инструкция по применению разработана подразделением ветеринарных препаратов  
ООО «Берингер Ингельхайм» (г. Москва).

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению  
вакцины Эурикан ДНПП<sub>1</sub>-LR, утвержденная Заместителем Руководителя Россельхознадзора  
04.03.2014 года.