

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

11.06.2025

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Фенпраз Форте суспензия

(Организация-разработчик: ООО «Агробиоснаб»,
105064, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный,
ул. Казакова, д.6, стр. 1)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-12.25-5337N/ПВР-3-12.25/04098

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Фенпраз Форте суспензия (Fenpraz Forte suspension).

Международное непатентованное наименование: пирантела памоат, празиквантел, фебантел, ивермектин.

2. Лекарственная форма: суспензия для приема внутрь.

Лекарственный препарат Фенпраз Форте суспензия содержит в качестве действующих веществ пирантела памоат, празиквантел, фебантел и ивермектин.

Лекарственный препарат выпускают в трех дозировках:

- Фенпраз Форте суспензия для кошек, собак мелких пород, котят и щенков с содержанием в 1 мл, рассчитанном на 2 кг массы животного, действующих веществ: пирантела памоата – 28,8 мг, празиквантела – 10 мг, фебантела – 30 мг, ивермектина – 0,012 мг;

- Фенпраз Форте суспензия для собак средних пород с содержанием в 1 мл, рассчитанном на 6 кг массы животного, действующих веществ: пирантела памоата – 86,4 мг, празиквантела – 30 мг, фебантела – 90 мг, ивермектина – 0,036 мг;

- Фенпраз Форте суспензия для собак крупных пород с содержанием в 1 мл, рассчитанном на 10 кг массы животного, действующих веществ: пирантела

памоата – 144 мг, празиквантела – 50 мг, фебантела – 150 мг, ивермектина – 0,06 мг.

В качестве вспомогательных веществ лекарственный препарат содержит: ксантановую камедь, сорбит, полиэтиленгликоль (ПЭГ-400), аспасвит Ц200, сорбат калия, бензоат натрия, лимонную кислоту и воду очищенную.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой однородную суспензию от светло-желтого до желтого цвета. Допускается расслоение суспензии, исчезающее после взбалтывания.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года с даты производства. После первого вскрытия флакона лекарственный препарат можно использовать в течение 6 месяцев.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 5 мл, 10 мл и 20 мл в полимерные флаконы соответствующей вместимости, герметично укупоренные навинчивающимися крышками с контролем первого вскрытия. Флаконы поштучно упаковывают в картонные пачки и дополнительно комплектуют шприцем-дозатором.

Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению и стикерами для ветеринарного паспорта.

5. Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2°C до 25°C.

6. Лекарственный препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Лекарственный препарат отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Лекарственный препарат относится к фармакотерапевтической группе: антигельминтные средства в комбинациях.

10. Комбинация входящих в состав лекарственного препарата пирантела памоата, празиквантела, фебантела и ивермектина обладает широким спектром антигельминтного действия в отношении круглых и ленточных гельминтов, включая *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trihuris vulpis*, *Echinococcus multilocularis*, *Echinococcus granulosus*, *Taenia* spp., *Dipylidium caninum*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides* spp., личиночных фаз развития (микрофилярий) *Dirofilaria immitis* и *Dirofilaria repens*, эффективна против простейших рода лямблий *Giardia* spp., паразитирующих у собак и кошек.

Пирантела памоат – соединение из группы пиразиномицинов, оказывает выраженное нематодоцидное действие. Механизм действия пирантела основан на блокаде передачи нервных импульсов в нервно-мышечных синапсах путем деполяризации мембран мышечных клеток, что вызывает паралич мышечной системы нематод. Пирантел плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте, что обеспечивает его пролонгированное действие на гельминтов в кишечнике. Выводится из организма в основном в неизмененном виде с фекалиями (93 %).

Празиквантел – синтетическое производное пиразиномицина, активен в отношении половозрелых и неполовозрелых цестод. Механизм действия празиквантала основан на индуцировании распада тегумента и ингибиции фумаратредуктазы, стойкой деполяризации мышечных клеток гельминтов, нарушении энергетического обмена, что вызывает паралич и гибель паразитов и способствует их выведению из желудочно-кишечного тракта. Празиквантел быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте, достигая максимальной концентрации в плазме крови через 1-3 часа, обратимо связывается с белками сыворотки крови (70-80 %), частично метаболизируется в печени, реэкскретируется в кишечник, выводится из организма в основном с мочой (до 80 %) в течение 24 часов.

Фебантел относится к пробензимидазолам, биотрансформирующими в организме в бензимидазолы, активен в отношении нематод. Механизм действия фебантела основан на нарушении транспорта глюкозы и микротрубулярной функции паразита, ингибиции фумаратредуктазы и синтеза АТФ, повышении проницаемости клеточных мембран, что приводит к нарушению мышечной иннервации, параличу, гибели паразита и способствует его элиминации из желудочно-кишечного тракта. Фебантел всасывается в кишечнике, метаболизируется в печени и выделяется с желчью в просвет кишечника, где частично отмечается его повторная резорбция. Выводится из организма как в неизмененной форме, так и в виде нескольких метаболитов с фекалиями и мочой.

Ивермектин – макроциклический лактон, обладает выраженным антигельминтным действием в отношении личиночных и половозрелых фаз развития нематод. Механизм действия ивермектина заключается в его влиянии на величину тока ионов хлора через мембранны нервных и мышечных клеток паразита. Основной мишенью являются глутамат-чувствительные хлорные каналы, а также рецепторы гамма-аминомасляной кислоты. Изменение тока ионов хлора нарушает проведение нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели паразита. Максимальная концентрация ивермектина в плазме крови отмечается через 3-6 часов после перорального введения. Выводится ивермектин из организма в основном с желчью, фекалиями и частично с мочой.

Лекарственный препарат по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), при

применении в рекомендуемых дозах хорошо переносится собаками и кошками разных пород и возрастов.

III. Порядок применения

11. Лекарственный препарат Фенпраз Форте суспензия применяют собакам и кошкам с 3-недельного возраста с профилактической и лечебной целью при нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, анкилостомоз, трихоцефалез), цестодозах (тениидозы, дипилидиоз, эхинококкоз, дифиллоботриоз, мезоцестоидоз), смешанных нематодо-цестодозных инвазиях, гиардиозе (лямблиозе); с профилактической целью при дирофиляриозе.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам (в том числе в анамнезе). Не следует применять лекарственный препарат истощенным, больным инфекционными заболеваниями и выздоравливающим животным. Не следует применять лекарственный препарат собакам и кошкам в возрасте до 3 недель и/или имеющим массу менее 0,5 кг, а также животным других видов.

Собакам с MDR1-мутацией, ввиду повышенной чувствительности к макроциклическим лактонам, лекарственный препарат применяют под наблюдением ветеринарного врача.

13. При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для ветеринарного применения. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с ним. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки глаз их необходимо промыть большим количеством воды. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Возможность применения лекарственного препарата самкам в период беременности и вскармливания приплода определяет лечащий ветеринарный врач на основании оценки отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения препарата. Не допускается дегельминтизация самок в первой половине беременности и ранее чем через 2-3 недели после родов, а также щенков и котят моложе 3-х недельного возраста.

15. Лекарственный препарат применяют животным внутрь однократно, индивидуально, в утреннее время с небольшим количеством корма или принудительно вводят на корень языка.

Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств не требуется. При дегельминтизации животного рекомендуется проводить дезинфекцию и дезинвазию мест содержания животных во избежание повторного заражения.

Животных дегельминтизируют с лечебной целью по показаниям, с профилактической целью – ежеквартально, перед вакцинацией - за 10-14 суток до вакцинации, перед родами - за 10 суток до предполагаемых родов в терапевтических дозах, указанных в таблице:

Вид животного	Вид препарата	Масса животного	Доза
Кошки, собаки мелких пород, котята и щенки	Фенпраз Форте суспензия для кошек, собак мелких пород, котят и щенков	0,5-1 кг	0,5 мл
		1-2 кг	1 мл
		2-3 кг	1,5 мл
		3-4 кг	2 мл
		4-5 кг	2,5 мл
		5-6 кг	3 мл
Далее 1 мл на каждые 2 кг массы животного.			
Собаки средних пород	Фенпраз Форте суспензия для собак средних пород	3-6 кг	1 мл
		6-9 кг	1,5 мл
		9-12 кг	2 мл
		12-15 кг	2,5 мл
		15-18 кг	3 мл
		Далее 1 мл на каждые 6 кг массы животного.	
Собаки крупных пород	Фенпраз Форте суспензия для собак крупных пород	10-20 кг	2 мл
		20-30 кг	3 мл
		30-40 кг	4 мл
		40-50 кг	5 мл
		50-60 кг	6 мл
		Далее 1 мл на каждые 10 кг массы животного.	

Для снижения количества циркулирующих микрофиллярий у животных, инвазированных *Dirofilaria immitis* или *Dirofilaria repens*, лекарственный препарат применяют ежемесячно.

С целью профилактики дирофиляриоза в неблагополучном по заболеванию регионе лекарственный препарат применяют в весенне-летне-осенний период: однократно - перед началом лета комаров (март-апрель), ежемесячно - с апреля по октябрь и однократно (последний раз в сезоне) – через 1 месяц после окончания лета комаров (октябрь-ноябрь).

Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков дегельминтизации животных.

Для лечения лямблиоза лекарственный препарат применяют один раз в день в течение 3-х суток.

16. Побочных явлений и осложнений у животных при применении

лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны следующие клинические проявления: повышенная саливация, диарея или рвота. Указанные симптомы кратковременны, самопроизвольно исчезают и не требуют применения других лекарственных средств.

17. При передозировке лекарственного препарата у животного может наблюдаться угнетенное состояние, отказ от корма, избыточное слюноотделение, диарея и рвота. В этом случае проводят симптоматическую терапию.

18. Лекарственный препарат не следует применять одновременно с пиперазином, левамизолом и средствами, ингибирующими холинэстеразу, ввиду возможного взаимного усиления токсичности.

19. Особеностей действия при первом применении лекарственного препарата или при его отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений доз и курса применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередного применения лекарственного препарата его следует применить как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

21. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «Агробиоснаб»,
143985, Московская область, Балашиха,
Полтевское шоссе, владение 4.

АО «Агробиопром»,
143985, Московская область, Балашиха,
Полтевское шоссе, владение 4.

ООО «Агробиоснаб»,
РФ, 105064, город Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Басманный,
ул. Казакова, д.6, стр. 1.

Генеральный директор
ООО «Агробиоснаб»

В.И. Чупахин

