СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

17.11.2025

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению МУЛЬТИКАН-DHP

(организация-разработчик – ООО «Ветбиохим», 109316, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, пр-кт Волгоградский, д. 42, этаж 12, ком. 12)

Номер регистрационного удостоверения: 77-1-24.25-5394№ ПВР-1-24.25/04141

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование – МУЛЬТИКАН-DHP

Международное непатентованное наименование – Вакцина против чумы, аденовирусных инфекций и парвовирусного энтерита собак

2. Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций (живая вакцина) – изготовлен из аттенуированных штаммов вируса чумы плотоядных (штамм № 37), аденовируса собак типа 2 (штамм № 46), парвовируса собак (штамм № 23) со средой высушивания (33% по объему), содержащей гидролизат казеина, декстран 70, сорбит, сахарозу, желатин.

3. По внешнему виду вакцина представляет собой сухую однородную пористую массу желто-розового цвета. Срок годности вакцины – 18 месяцев от даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна. Вакцину необходимо использовать в течение 15 минут после вскрытия флакона и растворения.

4. Вакцина расфасована по 1 $см^3$ (1 доза) в стеклянные флаконы вместимостью 3 мл. Флаконы укупорены резиновыми пробками, обжатыми алюминиевыми колпачками. Флаконы с вакциной упакованы в пластиковые коробки или блистеры - по 10 флаконов в каждом. В коробку (блистер) с вакциной вложена инструкция по ее применению.

5. Вакцину хранят и транспортируют при температуре от 2 до 8 °С.

6. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Вакцину во флаконах без маркировки, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, измененным внешним видом, не использованную в течение 15 минут после растворения бракуют, обезвреживают путем кипячения в течение 30 минут и утилизируют. Утилизация обезвреженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Вакцина отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. МУЛЬТИКАН-DHP относится к фармакотерапевтической группе «Вакцины, сыворотки, фаги и анатоксины».

10. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа к возбудителям чумы, аденовирусных инфекций 1-го и 2-го типов (инфекционный гепатит и инфекционный ларинготрахеит) и парвовирусного энтерита собак через 14 суток после иммунизации в соответствии со схемами вакцинации, изложенными в п. 15, продолжительностью до 3-х лет.

Одна иммунизирующая доза вакцины содержит не менее:

- вирус чумы плотоядных $10^{3,5}$ $ТЦД_{50}$;
- аденовирус собак 2-го типа $10^{3,5}$ $ТЦД_{50}$;

- парвовирус собак 1:128.

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

Ш. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Вакцина предназначена для профилактики чумы, аденовирусных инфекций (инфекционный гепатит и инфекционный ларинготрахеит) и парвовирусного энтерита собак.

12. Запрещено вакцинировать клинически больных и/или ослабленных животных.

13. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

14. Не подлежат вакцинации собаки в последний месяц беременности и щенки до 8-недельного возраста. Вакцинация в период лактации не рекомендована.

15. Вакцинации подлежат клинически здоровые собаки с 8-недельного возраста. Животным вакцину вводят двукратно с интервалом 21-28 суток. В случае необходимости более ранней защиты от чумы плотоядных и парвовирусного энтерита щенков с 6-недельного возраста вакцинируют вакциной МУЛЬТИКАН-DP, а затем двукратно с интервалом 21-28 суток вакциной МУЛЬТИКАН-DHP.

Ранее невакцинированным взрослым животным вакцину вводят двукратно с интервалом 21-28 суток. Ревакцинацию вакциной МУЛЬТИКАН-DHP проводят ежегодно. В дальнейшем, допускается снижение кратности ревакцинации до 1-го раза в 3 года у животных, получивших курс из 2-х первичных инъекций вакцины и ревакцинированных через 1 год.

В качестве растворителя для вакцины МУЛЬТИКАН-DHP применяют воду для инъекций (в комплект не входит) или инактивированные вакцины МУЛЬТИКАН-L, МУЛЬТИКАН-LR, РАБИКС.

Перед применением вакцину МУЛЬТИКАН-DHP растворяют в 1 мл воды для инъекций или выбранной инактивированной вакцины и тщательно встряхивают до полного растворения.

Вакцину вводят внутримышечно или подкожно в дозе 1 мл. Растворенный препарат должен быть использован в течение 15 минут.

Следует избегать контакта вакцинированного животного с потенциальным источником вируса чумы плотоядных, адено- и парвовирусов собак в течение 7 дней после вакцинации.

Так как вакцинация с помощью вакцины МУЛЬТИКАН-DHP может являться частью более полного курса иммунизации, применимы следующие схемы вакцинации:

Ранняя вакцинация щенков против чумы плотоядных и парвовирусного энтерита собак, уровень колостральных антител неизвестен	
Схема 1	
Возраст 6-7 недель	МУЛЬТИКАН-DP
Возраст 9-10 недель	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L
Возраст 12-13 недель	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L и РАБИКС или с МУЛЬТИКАН-LR
Возраст 15-16 недель, для регионов с неблагополучной эпизоотической ситуацией по бешенству и\или для животных с высоким риском контакта с вирусом бешенства	РАБИКС
Схема 2	
Возраст 6-7 недель	МУЛЬТИКАН-DP

Возраст 9-10 недель	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L и РАБИКС или с МУЛЬТИКАН-LR
Возраст 12-13 недель	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L
Возраст 12-13 недель, для регионов с неблагополучной эпизоотической ситуацией по бешенству и\или для животных с высоким риском контакта с вирусом бешенства	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L и РАБИКС или с МУЛЬТИКАН-LR
Вакцинация щенков с 8-недельного возраста	
Схема 1	
Возраст 8-10 недель	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L
Возраст 12-13 недель	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L и РАБИКС или с МУЛЬТИКАН-LR
Возраст 15-16 недель, для регионов с неблагополучной эпизоотической ситуацией по бешенству и\или для животных с высоким риском контакта с вирусом бешенства	РАБИКС
Схема 2	
Возраст 8-10 недель	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L и РАБИКС или с МУЛЬТИКАН-LR
Возраст 12-13 недель	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L
Возраст 12-13 недель, для регионов с неблагополучной эпизоотической ситуацией по бешенству и\или для животных с высоким риском контакта с вирусом бешенства	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L и РАБИКС или с МУЛЬТИКАН-LR
Вакцинация ранее невакцинированных животных старше 12-недельного возраста	
1-я вакцинация	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L и РАБИКС или с МУЛЬТИКАН-LR
2-я вакцинация (интервал 21-28 дней)	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L
2-я вакцинация (интервал 21-28 дней), для регионов с неблагополучной эпизоотической ситуацией по бешенству и\или для животных с высоким риском контакта с вирусом бешенства	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L и РАБИКС или с МУЛЬТИКАН-LR
Ревакцинация от чумы плотоядных, аденовирусных инфекций и парвовирусного энтерита собак	
Ежегодная. В дальнейшем допускается снижение кратности ревакцинации до одного раза в 3-года у животных, получивших курс из 2-х первичных инъекций вакцины и ревакцинированных через 1 год.	
Ревакцинация от лептоспироза	
Ежегодная	
Ревакцинация от бешенства	
Ежегодная, для регионов с неблагополучной эпизоотической ситуацией по бешенству и\или для животных с высоким риском контакта с вирусом бешенства	

Раз в 3-года в районах с благополучной эпизоотической ситуацией по бешенству и\или при условии контроля уровня поствакцинальных антирабических антител методом FAVN

16. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. На месте инъекции возможно появление быстро исчезающей припухлости. В случае проявления у отдельных животных аллергических реакций на введение вакцины назначают симптоматическое лечение.

17. Симптомов чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного энтерита или других патологических признаков при передозировке вакцины не выявлено.

18. Допускается применение вакцины МУЛЬТИКАН-DHP совместно с водой для инъекций или вакцинами МУЛЬТИКАН-L, МУЛЬТИКАН-LR, РАБИКС, которые служат растворителями. При необходимости одновременного применения вакцины МУЛЬТИКАН-DHP совместно с вакцинами МУЛЬТИКАН-L и РАБИКС, лиофилизированную вакцину растворяют в любой одной из двух вакцин, а вторую вводят в другом шприце.

Вакцину не применяют в одном шприце с другими биопрепаратами и лекарственными средствами.

19. Особенностей поствакцинальной реакции при первичной и повторной вакцинации не установлено.

20. Следует избегать нарушений схемы вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики чумы плотоядных, аденовирусных инфекций (инфекционный гепатит и инфекционный ларинготрахеит) и парвовирусного энтерита собак. В случае пропуска очередного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее по предусмотренной инструкцией схеме и дозировке.

21. Сроки возможного использования продукции животного происхождения после введения вакцины МУЛЬТИКАН-DHP не устанавливаются.

Наименование и адрес производственной площадки производителя вакцины против чумы, аденовирусных инфекций и парвовирусного энтерита собак: ООО «Ветбиохим», 109316, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, пр-кт Волгоградский, д. 42, корп. 5.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: ООО «Ветбиохим», 109316, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, пр-кт Волгоградский, д. 42, этаж 12, ком. 12.

И.о. генерального директора ООО «Ветбиохим» А.В. Базыкин