

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Дронтала плюс для лечения
и профилактики гельминтозов и лямблиоза собак

(организация-разработчик компания «Bayer Animal
Health GmbH», Германия)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Дронтал плюс (Drontal plus).

Международное непатентованное наименование: пирантел эмбонат, празиквантел, фебантел.

2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Дронтал плюс в качестве действующих веществ в 1 таблетке содержит: пирантел эмбонат - 144 мг, празиквантел - 50 мг и фебантел – 150 мг, а также вспомогательные компоненты: лактозы моногидрат – 100 мг, микрокристаллическую целлюлозу – 49 мг, крахмал кукурузный – 143 мг, поливидон – 18 мг, магния стеарат – 3 мг, натрия лаурила сульфат – 2 мг, кремний коллоидный безводный – 1 мг, пищевую добавку со вкусом мяса – 116,5 мг.

По внешнему виду представляет собой таблетку в форме кости от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с разделительной бороздкой по центру.

Таблетки Дронтал плюс фасуют в блистеры, которые упаковывают в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.

3. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 5 лет со дня производства.

Запрещается применение Дронтала плюс по истечении срока годности.

4. Хранят Дронтал плюс в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°C до 25°C.

5. Дронтал плюс следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Дронтал плюс относится к группе комбинированных антигельминтных препаратов.

Дронтал плюс обладает широким спектром антигельминтного действия на круглых, ленточных гельминтов и простейших рода лямблий, паразитирующих у собак, включая *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trihuris vulpis*, *Echinococcus multilocularis*, *Echinococcus granulosus*, *Taenia* spp., *Dipylidium caninum*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides* spp., *Giardia* spp.

Механизм действия фебантела, входящего в состав лекарственного препарата основан на нарушении транспорта глюкозы и микротубулярной функции паразита, ингибировании фумаратредуктазы и синтеза АТФ, повышении проницаемости клеточных мембран, что приводит к нарушению мышечной иннервации, параличу, гибели паразита и способствует его элиминации из желудочно-кишечного тракта.

Пирантел эмбонат оказывает выраженное нематодоцидное действие, вызывая повышение проницаемости клеточных мембран, необратимый паралич и контрактуру мышц у нематод, что приводит к гибели паразита и способствует его элиминации из желудочно-кишечного тракта. Пирантел эмбонат и фебантел частично всасываются в кишечнике и выводятся из организма в основном с фекалиями в течение 24 – 48 часов.

Механизм действия празиквантела, заключается в деполяризации нейромышечных ганглиоблокаторов, нарушении транспорта глюкозы и микротурбулярной функции у цестод, что приводит к нарушению мышечной иннервации, параличу и гибели паразита. Празиквантел быстро всасывается в кишечнике и распределяется во внутренних органах и тканях; выводится из организма с мочой в основном в метаболитизированной форме.

Дронтал плюс по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического, тератогенного и сенсибилизирующего действия. Хорошо переносится собаками разных пород и возраста.

III. Порядок применения

8. Дронтал плюс назначают собакам с профилактической и лечебной целью при нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, анкилостомоз, трихоцефалез) и цестодозах (тениидозы, дипилидиоз, эхинококкозы, мезоцестоидоз) и гитардиозе (лямблиозе).

9. Противопоказанием к применению Дронтала плюс является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе). Дронтал плюс не следует применять щенным сукам первые две трети периода беременности. Препарат разрешен к применению в период лактации. Не рекомендуется применять Дронтал плюс щенкам моложе 2-х недельного возраста и весом менее 2 кг.

10. Препарат применяют собакам индивидуально однократно в утреннее кормление, из расчета 1 таблетка (0,78 г) на 10 кг массы животного. Дозы препарата указаны в таблице:

Масса собаки	Доза Дронтала плюс
Щенки и собаки маленьких пород	
2 - 5 кг	½ таблетки
6 - 10 кг	1 таблетка
Собаки средних пород	
11-20 кг	2 таблетки
21-30 кг	3 таблетки
Собаки крупных пород	
31-40 кг	4 таблетки
41-50 кг	5 таблеток

Благодаря вкусовой добавке, препарат хорошо поедается собаками. С лечебной целью животных дегельминтизируют по показаниям, с профилактической целью - ежеквартально в терапевтической дозе. Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств перед дегельминтизацией не требуется.

При лечении лямблиоза препарат применяют в рекомендованных дозировках в течение 3-х дней подряд.

При дегельминтизации собак рекомендуется проводить дезинфекцию и дезинвазию мест содержания животных во избежание повторного заражения.

11. Симптомов, возникающих при передозировке препарата, не установлено.

12. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.

13. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Дронтала плюс в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата, возможны повышенная саливация, диарея или рвота. Указанные симптомы кратковременны, самопроизвольно исчезают и не требуют применения лекарственных средств.

15. Не рекомендуется применять Дронтал плюс с препаратами, содержащими пиперазин, ввиду возможных антагонистических эффектов.

16. Дронтал плюс не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Дронталом плюс следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Дронталом плюс. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно

обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель компания «Bayer Animal Health GmbH»; KVP Pharma and Veterinary product GmbH, Projensdorfer str. 324, D-24106 Kiel.

Инструкция разработана компанией «Bayer Animal Health GmbH» (Германия) совместно с ЗАО «Байер» (123022, Москва, Б. Трехгорный пер., д.1, стр.1) .

С утверждением настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению Дронтала-плюс, утвержденную Россельхознадзором 21.04. 2011 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

