

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

**Н.А.ВЛАСОВ**

**09.08.2019**

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Катозал<sup>®</sup>  
(Организация-разработчик: компания «Bayer Animal Health GmbH»  
Kaiser-Wilhelm-Allee 10, D-51373 Leverkusen, Германия)

Номер регистрационного удостоверения: *276-3-18.12-322117ВЧ-3-0.2/01071*

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Катозал<sup>®</sup> (Catosal<sup>®</sup>).  
Международные непатентованные наименования: бутафосфан, цианокобаламин.
2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.  
Катозал<sup>®</sup> в 100 мл в качестве действующих веществ содержит бутафосфан - 10,0 г, цианокобаламин - 0,005 г, а также вспомогательные вещества: спирт бутиловый, гидроксид натрия и воду для инъекций.
3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость розового цвета.  
Срок годности лекарственного препарата Катозал<sup>®</sup> при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 5 лет со дня производства, после вскрытия флакона – в течение 28 суток.  
Запрещается применение лекарственного препарата Катозал<sup>®</sup> по истечении срока годности.
4. Выпускают лекарственный препарат Катозал<sup>®</sup> расфасованным в стеклянные флаконы по 100 мл, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы поштучно упакованы в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.
5. Хранят лекарственный препарат Катозал<sup>®</sup> в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5<sup>0</sup>С до 25<sup>0</sup>С.
6. Катозал<sup>®</sup> следует хранить в недоступном для детей месте.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Катозал<sup>®</sup> относится к комплексным препаратам, предназначенным для стимуляции обменных процессов и неспецифической резистентности.

10. Катозал<sup>®</sup> обладает тонизирующими свойствами, нормализует метаболические и регенеративные процессы, оказывает стимулирующее влияние на белковый, углеводный и жировой обмен веществ, повышает резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды, способствует росту и развитию животных.

Катозал<sup>®</sup> по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендованных дозах не оказывает местно-раздражающего, сенсибилизирующего, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и канцерогенного действия, не обладает кумулятивными свойствами.

## III. Порядок применения

11. Катозал<sup>®</sup> назначают крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, свиньям, собакам, кошкам, пушным зверям при нарушениях обмена веществ различной этиологии, а также в качестве стимулирующего и тонизирующего средства:

- для повышения сопротивляемости организма к заболеваниям различной этиологии;

- как дополнительное средство при лечении заболеваний, обусловленных недостаточностью в организме кальция и магния;

- при родах, а также в целях профилактики послеродовых осложнений (тетания, родильный парез);

- при тяжелых физических нагрузках и повышенной физической активности у спортивных лошадей (за 2-3 дня до соревнований).

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата Катозал<sup>®</sup> является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. При работе с лекарственным препаратом Катозал<sup>®</sup> следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Во время работы с лекарственным препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с лекарственным препаратом Катозал<sup>®</sup>. При случайном

попадании лекарственного препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом, при попадании в глаза - промыть их в течение нескольких минут проточной водой. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Лекарственный препарат Катозал<sup>®</sup> разрешён к применению беременным и лактирующим животным.

15. Катозал<sup>®</sup> применяют крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, свиньям, собакам, кошкам, пушным зверям один раз в сутки внутримышечно, подкожно или внутривенно (медленно), в дозах, указанных в таблице:

Вид животного	Доза (мл на животное)
Взрослые лошади и крупный рогатый скот	10,0-25,0
Жеребята, телята	5,0-12,0
Взрослые овцы и козы	2,5-8,0
Ягнята, козлята	1,5-2,5
Взрослые свиньи	2,5-10,0
Поросята-сосуны, подсвинки	1,0-2,5
Собаки	0,5-5,0
Кошки, пушные звери	0,5-2,5

При хроническом течении болезни назначают  $\frac{1}{2}$  дозы препарата Катозал<sup>®</sup>, указанной в таблице. Повторный курс лечения при необходимости проводят с интервалом 5-14 дней.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата Катозал<sup>®</sup> в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

17. Симптомов, возникающих при передозировке препарата, не установлено.

18. Информация о взаимодействии препарата Катозал<sup>®</sup> с лекарственными препаратами других фармакологических групп и кормовыми добавками отсутствует.

19. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередного применения лекарственного препарата Катозал<sup>®</sup>, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной дозы использование препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Убой животных на мясо и использование в пищевых целях мясопродуктов, молока во время и после применения лекарственного препарата Катозал<sup>®</sup> разрешается без ограничений.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

«Bayer HealthCare LLC»; 12707, Shawnee Mission Parkway Shawnee, Kansas 66201-0390 (USA): производство и фасовка в первичную упаковку

«KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH»; Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel (Germany): вторичная упаковка, выпускной контроль качества, ввод лекарственного препарата в гражданский оборот

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

АО «БАЙЕР»  
Москва, 107113, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2;  
тел. (495) 234-2000