Согласовано
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

25. 06. 2026

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
Мелоксикам Апиценна суспензия

(организация-разработчик: АО «АПИ-САН»,
119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 1А, кв. 74)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-11.26-5555/ПВР-3-11.26/04197

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: Мелоксикам Апиценна суспензия (Meloxicam Apicenna suspension);

международное непатентованное наименование: мелоксикам.

2. Лекарственная форма: суспензия для приема внутрь.

Препарат Мелоксикам Апиценна суспензия выпускают в двух концентрациях: в 1 мл содержит в качестве действующего вещества мелоксикам 0,5 мг/мл или 1,5 мг/мл, а в качестве вспомогательных веществ: глицерин, поливинилпирролидон, натрия дигидрофосфат, ксантановую камедь, лимонную кислоту, динатрия гидрофосфат, полисорбат 80, натрия бензоат, полидиметилсилоксан, воду очищенную.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой суспензию от светло-зелено-желтого или светло-желтого до зеленовато-желтого или желтого цвета.

При хранении допускается расслоение, исчезающее после встряхивания.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года со дня производства, после вскрытия флакона – 6 месяцев.

Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

4. Препарат Мелоксикам Апиценна суспензия выпускают расфасованным по 10 мл и 30 мл во флаконы из полимерного материала, укупоренные адаптерами полимерными для шприца-дозатора и пластиковыми колпачками. Каждый флакон оклеивают этикетками самоклеящимися.

Флаконы упаковывают поштучно в пачки из картона. Каждую потребительскую упаковку препарата комплектуют шприцем-дозатором и инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2 °С до 25 °С.

6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: нестероидные противовоспалительные средства класса оксикамов.

10. Мелоксикам, входящий в состав препарата, обладает обезболивающим, противовоспалительным и жаропонижающим действием. Механизм действия связан с ингибированием синтеза простагландинов в результате избирательного подавления ферментативной активности циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), участвующей в биосинтезе простагландинов в области воспаления.

При пероральном применении лекарственного препарата мелоксикам хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта, медиана максимальной концентрации в плазме крови составляет 6 часов, в крови мелоксикам активно связывается с белками плазмы крови, что обеспечивает его длительное действие. Метаболизм происходит в печени с образованием неактивных метаболитов, выводится главным образом с желчью (до 75%), остальная часть выводится почками.

Мелоксикам Апиценна суспензия в рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического, тератогенного и канцерогенного действия.

III. Порядок применения

11. Мелоксикам Апиценна суспензию применяют собакам и кошкам в качестве противовоспалительного, обезболивающего и жаропонижающего средства при воспалительных и болевых синдромах различного происхождения, а также в послеоперационный период.

12. Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата. Запрещается применение лекарственного препарата при язве желудка и 12-перстной кишки, выраженной почечной, печеночной и сердечной недостаточности, геморрагическом синдроме, животным в состоянии дегидратации, гиповолемии и гипотензии, ввиду возможного токсического влияния лекарственного препарата на почки.

13. При работе с препаратом Мелоксикам Апиценна суспензия следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их следует промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с лекарственным препаратом Мелоксикам Апиценна суспензия. В случае появления аллергических

реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Запрещается использование пустой тары из-под препарата для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Препарат не предназначен для применения беременным и лактирующим самкам, щенкам и котятам моложе 6-недельного возраста.

15. Лекарственный препарат применяют животным перорально с кормом или вводят принудительно с помощью дозатора на корень языка 1 раз в сутки во время кормления. Перед применением флакон с препаратом необходимо встряхнуть.

Мелоксикам Апиценна суспензию 0,5 мг/мл (для кошек и собак мелких пород) применяют в следующих дозах:

- кошкам в первый день лечения – 1 мл на 5 кг массы животного (0,1 мг мелоксикама на 1 кг массы животного), в последующие дни лечения – 1 мл на 10 кг массы животного (0,05 мг мелоксикама на 1 кг массы животного);
- собакам в первый день лечения – 1 мл на 2,5 кг массы животного (0,2 мг мелоксикама на 1 кг массы животного), последующие дни лечения – 1 мл на 5 кг массы животного (0,1 мг мелоксикама на 1 кг массы животного).

Мелоксикам Апиценна суспензию 1,5 мг/мл (для собак средних и крупных пород) применяют в следующих дозах:

- собакам в первый день лечения – 1 мл на 7,5 кг массы животного (0,2 мг мелоксикама на 1 кг массы животного), в последующие дни лечения – 1 мл на 15 кг массы животного (0,1 мг мелоксикама на 1 кг массы животного).

Продолжительность лечения определяется конкретным диагнозом и интенсивностью проявления клинических симптомов. У собак возможно применение препарата в течение 28 дней под контролем ветеринарного врача. У кошек продолжительность курса должна быть не более 5 дней.

16. При применении препарата Мелоксикам Апиценна суспензия, как и при применении других нестероидных противовоспалительных препаратов, в редких случаях в первые дни лечения животного возможны: потеря аппетита, рвота, диарея. Указанные симптомы, как правило, исчезают после отмены препарата. При индивидуальной повышенной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении аллергических реакций его использование прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. Симптомы передозировки при применении препарата у животного могут проявляться рвотой, диареей, анорексией, угнетенным состоянием, желудочно-кишечным кровотечением. Специфические антидоты отсутствуют, животному назначают симптоматические препараты и поддерживающую терапию.

18. Не следует одновременно применять Мелоксикам Апиценна суспензию с другими нестероидными противовоспалительными препаратами, глюкокортикостероидами, диуретиками, антикоагулянтами, аминогликозидными антибиотиками, ингибиторами АПФ и другими лекарственными препаратами, для которых характерна высокая степень связывания с сывороточными белками, из-за вероятности желудочно-кишечных кровотечений, а также ранее, чем через 24

часа после окончания применения предыдущего нестероидного противовоспалительного препарата.

19. Особенностей действия при первом приеме препарата и его отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений режима дозирования препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска очередной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Препарат Мелоксикам Апиценна суспензия не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.	ООО «Апиценна», 143921, Московская область, г. о. Балашиха, Новомилетское шоссе, дом 11.
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.	ООО «Апиценна», 143921, Московская область, г. о. Балашиха, Новомилетское шоссе, дом 11. + 7 (495) 580-77-13, www.apicenna.ru, info@apicenna.ru.

Заместитель генерального директора
АО «АПИ-САН» А.А. Смирнов