

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

01.07.2025

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Петмелокс VETЗАБОТА®

(Организация-разработчик: ООО «Агробиоснаб»,
105064, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный,
ул. Казакова, д.6, стр. 1)

Номер регистрационного удостоверения: 47-3-13.25-5345/ПОР-3-13.25/04128

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Петмелокс VETЗАБОТА® (Petmelox VETЗАБОТА®)

Международное непатентованное наименование: мелоксикам.

2. Лекарственная форма: таблетки для приема внутрь.

Лекарственный препарат Петмелокс VETЗАБОТА® выпускают в двух дозировках: с содержанием действующего вещества мелоксикама в 1 таблетке 0,5 мг и 2 мг соответственно.

В качестве вспомогательных веществ лекарственный препарат содержит: диоксид кремния коллоидный, стеарат кальция, ароматизатор, целлюлозу микрокристаллическую, лактозу.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой круглые плоскоцилиндрические таблетки от белого до светло-желтого цвета с темно-коричневыми вкраплениями, с фаской и разделительной риской на одной стороне.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года с даты производства.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 10 таблеток в блистеры (контурную ячейковую упаковку из полимерных материалов и фольги алюминиевой), упакованные в картонные пачки.

Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 25°C.

6. Лекарственный препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Лекарственный препарат отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Лекарственный препарат Петмелокс VETЗАБОТА® относится к фармакотерапевтической группе: НПВС – Оксикамы.

10. Мелоксикам относится к нестероидным противовоспалительным средствам (НПВС) группы оксикамов. Оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие на организм животного.

Механизм действия мелоксикама заключается в подавлении выработки циклооксигеназы (ЦОГ) в цикле арахидоновой кислоты, при этом преимущественно подавляется выработка ЦОГ-II, под действием которой происходит синтез воспалительных простагландинов (ПГЕ₁ и ПГЕ₂), вызывающих воспаление, отек и боль.

После применения лекарственного препарата внутрь животным мелоксикам хорошо всасывается из кишечника и в течение 7,5 часов достигает максимальной концентрации в плазме крови, период полувыведения составляет 24 часа. Метаболизируется в печени и выводится с желчью (75%) в виде метаболита глюкуроновой кислоты.

Лекарственный препарат Петмелокс VETЗАБОТА® по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Лекарственный препарат Петмелокс VETЗАБОТА® применяют собакам и кошкам в качестве противовоспалительного, жаропонижающего и болеутоляющего средства при воспалительных и болевых синдромах различного происхождения, включая острые и хронические заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, синовиты, вывихи), воспалительные заболевания мягких тканей, а также в послеоперационный период.

12. Противопоказаниями к применению лекарственного препарата Петмелокс VETЗАБОТА® являются индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам (в том числе в анамнезе), язва желудка и 12-перстной кишки, выраженная почечная, печеночная и сердечная недостаточность, геморрагический синдром. Запрещается применение лекарственного препарата животным в состоянии дегидратации, гиповолемии и гипотензии, ввиду возможного токсического влияния лекарственного препарата на почки.

13. При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для ветеринарного применения. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с ним. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки глаз их необходимо промыть большим количеством воды. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании компонентов лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Не следует применять лекарственный препарат беременным и лактирующим самкам, щенкам и котятм в возрасте до 6 недель.

15. Лекарственный препарат Петмелокс VETЗАБОТА® применяют животным перорально (внутрь), индивидуально, в смеси с кормом или принудительно вводят на корень языка, один раз в сутки в дозе 0,2 мг/кг

мелоксикама в первый день лечения, далее в поддерживающей дозе 0,1 мг/кг мелоксикама.

Продолжительность курса применения лекарственного препарата определяет ветеринарный врач в зависимости от показаний, но она должна составлять: для собак – не более 10 дней, для кошек – не более 5 дней подряд.

При хроническом течении заболевания у собак возможно применение препарата в течение 28 дней под контролем ветеринарного врача.

16. Побочных явлений и осложнений у животных при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В редких случаях возможны: потеря аппетита, апатия, рвота, диарея, скрытая кровь в фекалиях. Побочные действия обычно проявляются в первую неделю применения лекарственного препарата и в большинстве случаев самостоятельно проходят после отмены.

В очень редких случаях возможны геморрагические рвота и диарея, а также нарушение функции почек. В этом случае необходимо прекратить применение лекарственного препарата и проконсультироваться с ветеринарным врачом. Рекомендуется симптоматическое лечение.

17. Передозировка лекарственного препарата приводит к нарушению функции слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (язве, гастриту), проявляющемуся рвотой и диареей, возможно с кровью, реже - к нарушению функции почек. В случае передозировки лекарственного препарата рекомендуется симптоматическое лечение.

18. Лекарственный препарат не рекомендуется применять совместно с другими НПВС, глюкокортикоидами, диуретиками, антикоагулянтами, аминогликозидными антибиотиками и другими лекарственными препаратами, для которых характерна высокая степень связывания с сывороточными белками из-за вероятности усиления токсического действия лекарственного препарата.

В случае отсутствия эффективности от применения других НПВС лекарственный препарат назначают не ранее чем через 24 часа после отмены предыдущего препарата и применяют под контролем ветеринарного врача.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении или отмене не установлено.

20. Следует избегать нарушений доз и схемы применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его терапевтической эффективности. В случае пропуска очередного применения лекарственного

препарата его следует применить как можно быстрее в той же дозе и по той же схеме.

21. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса
производственных площадок
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

ООО «Агробиоснаб»,
143985, Московская область, Балашиха,
Полтевское шоссе, владение 4.

АО «Агробιοпром»,
143985, Московская область, Балашиха,
Полтевское шоссе, владение 4.

Наименование, адрес
организации, уполномоченной
держателем или владельцем
регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие
претензий от потребителя.

ООО НПП «МОСЗООВЕТСНАБ»,
115432, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская,
д.16.

Генеральный директор
ООО «Агробиоснаб»



В.И. Чупахин