

19.01.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению МУЛЬТИФЕЛ
(организация-разработчик – ООО «Ветбиохим», 109316, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Печатники, пр-кт Волгоградский, д. 42, этаж 12, ком. 12)

Номер регистрационного удостоверения: 77-1-4.19-4429 №ПВР-1-2.1/00681

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование – МУЛЬТИФЕЛ

Международное непатентованное наименование – Вакцина против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивирусной инфекции кошек

2. Лекарственная форма – суспензия для инъекций (инактивированная вакцина). Вакцина МУЛЬТИФЕЛ произведена из инактивированных производственных штаммов вирусов панлейкопении (штамм «Тайс»), инфекционного ринотрахеита кошек (штамм «Гранд»), калицивируса кошек (штамм «Ларс») и адьюванта в количестве 2% от объема вакцины.

3. По внешнему виду вакцина представляет собой прозрачную или слегка мутноватую жидкость, цвет которой может варьировать от светло-желтого до розового, с незначительным осадком на дне флакона, который при взбалтывании легко разбивается в гомогенную суспензию. Срок годности вакцины – 18 месяцев от даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна. Вакцину необходимо использовать в течение 15 минут после вскрытия флакона.

4. Вакцина расфасована по 1 мл (1 доза) в стеклянные флаконы вместимостью 3 мл. Флаконы укупорены резиновыми пробками, обжатými алюминиевыми колпачками. Флаконы с вакциной упакованы по 10 шт. в пластиковые коробки или блистеры. В каждую коробку (блистер) вложена инструкция по применению вакцины.

5. Вакцину хранят и транспортируют при температуре от 2 °С до 8 °С.

6. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Флаконы с вакциной, подвергшиеся замораживанию, без этикеток, с нарушенной укупоркой и целостностью, измененным цветом вакцины, содержащие посторонние примеси или не разбивающийся при взбалтывании осадок, а также вакцину, не использованную в течение 15 минут после вскрытия флакона, выбраковывают и обезвреживают путем кипячения в течение 30 мин с последующей утилизацией. Утилизация обезвреженного препарата не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Вакцина отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. МУЛЬТИФЕЛ – вакцины, сыворотки, фаги и анатоксины.

10. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у животных к возбудителям панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивирусной инфекции кошек через 14 суток после иммунизации, продолжительностью не менее 1 года.

Одна иммунизирующая доза вакцины содержит не менее:

- калицивирус кошек	$10^{5,0}$ ТЦД ₅₀
- герпесвирус кошек	$10^{5,0}$ ТЦД ₅₀
- парвовирус кошек	$10^{3,0}$ ГАЕ

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Вакцина предназначена для профилактики панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивирусной инфекции кошек.

12. Запрещено вакцинировать клинически больных и/или ослабленных животных.

13. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного назначения.

14. Не подлежат вакцинации кошки в последний месяц беременности и в период лактации, котята – до 8-недельного возраста.

15. Вакцинации подлежат клинически здоровые животные, прошедшие дегельминтизацию. Вакцину вводят подкожно или внутримышечно, котятам с 8-12-недельного возраста двукратно с интервалом 21-28 суток в дозе 1 мл независимо от массы тела и породы кошек. Ранее не вакцинированных, взрослых животных вакцинируют двукратно с интервалом 21-28 суток. Ревакцинацию кошек проводят ежегодно. Перед использованием вакцины каждый флакон взбалтывают.

Вакцинацию проводят с соблюдением правил асептики, для инъекции используют только стерильные материалы и инструменты. Для каждого животного используют отдельную иглу. Место инъекции дезинфицируют 70%-ным спиртом.

16. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. На месте инъекции возможно появление быстро исчезающей припухлости. В случае возникновения у животных аллергических реакций на введение вакцины требуется провести симптоматическую терапию.

17. Симптомов проявления панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивирусной инфекции или других патологических признаков при передозировке вакцины не выявлено.

18. Допускается применение вакцины МУЛЬТИФЕЛ с вакциной против вирусной лейкемии кошек инактивированной ЛЕОМИНОР и вакциной против бешенства кошек инактивированной РАБИФЕЛ, при условии их раздельного введения. Вакцину МУЛЬТИФЕЛ не применяют одновременно с другими биопрепаратами.

19. Особенности поствакцинальной реакции при первичной, повторной вакцинации и ревакцинации не установлены.

20. Следует избегать нарушений схемы вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивирусной инфекции кошек. В случае пропуска повторного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее в предусмотренной дозировке и по той же схеме.

21. Сроки возможного использования продукции животного происхождения после введения вакцины МУЛЬТИФЕЛ не устанавливаются.

Наименование и адрес производственной площадки производителя вакцины против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивирусной инфекции кошек: ООО «Ветбиохим», 109316, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, пр-кт Волгоградский, д. 42, корп. 5.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: ООО «Ветбиохим», 109316, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, пр-кт Волгоградский, д. 42, этаж 12, ком. 12.

И.о. генерального директора ООО «Ветбиохим»

А.В. Базыкин

