СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

25.05.2026

# ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Метоменол®

(Организация – разработчик: ООО «АлексАнн», 141705, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-09.26-3516 N ПВР-3-09.26/04187

## I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Метоменол® (Metomenol®).

Химическое наименование: тиохроменол.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Метоменол® в 1,0 мл в качестве действующего вещества содержит тиохроменол – 5 мг, в качестве вспомогательных веществ бензиловый спирт, пропиленгликоля дикаприлокапрат.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года с даты производства, после первого вскрытия флакона – 28 суток. Метоменол® запрещается применять по истечении срока годности.

4. Выпускают Метоменол® расфасованным по 10 и 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками и закатанные алюминиевыми колпачками. Флаконы поштучно упаковывают в индивидуальные картонные пачки. Каждая единица фасовки сопровождается инструкцией по применению.

5. Метоменол® хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5 до 30 °С.

6. Метоменол® следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Метоменол® относится к неопиоидным ненаркотическим анальгезирующим средствам центрального действия.

10. Тиохроменол, действующее вещество препарата, обладает анальгетическим действием, механизм которого заключается в воздействии тиохроменола на каннабиноидные CB1-рецепторы, дофаминовые D1- и D2-рецепторы (агонист) и направлено на снижение активности ноцицептивной и повышение активности антиноцицептивной систем организма. Опиоидные рецепторы не вовлечены в реализацию анальгетического эффекта, в связи с чем побочные эффекты, свойственные наркотическим анальгетикам, не проявляются.

При подкожном введении тиохроменол быстро проникает из места инъекции в системный кровоток, обнаруживается в плазме крови животных спустя 15 – 30 минут после введения препарата. Максимальная концентрация тиохроменола в плазме крови собак достигается через 2-3 часа, среднее значение Cmax 16,7 нг/мл. Период полувыведения (T1/2) из плазмы крови составляет 17,6 ч. Средняя площадь под фармакокинетической кривой (AUC0-t) – 296,8 нг/мл*ч, AUC0-∞ - 350,1 нг/мл*ч, среднее время удержания препарата в организме – 24,4 часа.

Тиохроменол не метаболизируется. Выводится через печень и почки в неизменном виде. У пациентов с нарушенной функцией почек период полувыведения препарата может быть увеличен.

По степени воздействия на организм лекарственный препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

## III. Порядок применения

11. Метоменол® применяют собакам в качестве симптоматического анальгетического средства при умеренном и выраженном болевом синдроме различной этиологии (травмы, ортопедические патологии, стоматологические патологии, пиодермия, воспалительные заболевания ЖКТ, спастические сокращения кишечника, патологии мочевыводящей системы, боли в послеоперационный период, боли у онкологических пациентов), а также при премедикации.

12. Противопоказаниями к применению Метоменола® является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Животным с патологиями почек и печени следует применять препарат Метоменол® с осторожностью.

13. При работе с Метоменолом® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустую тару

из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Метоменола® следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае возникновения аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Метоменол® не обладает эмбриотоксическим, фетотоксическим и тератогенным действием. Беременным и кормящим самкам, а также щенкам моложе 6-месячного возраста следует применять препарат Метоменол® под контролем ветеринарного врача.

15. Метоменол® вводится в дозах 0,1-0,2 мл на 1 кг массы тела (0,5-1 мг тиохроменола на 1 кг массы тела) подкожно 1-2 раза в сутки.

Доза устанавливается индивидуально в зависимости от интенсивности болевого синдрома и реакции животного.

Продолжительность лечения 1-9 дней.

Возможно применение препарата в составе мультимодальной аналгезии в послеоперационный период и для премедикации.

При применении Метоменола® в премедикацию рекомендуется контролировать показатели гемодинамики, температуру тела. Прямого действия на дыхательный центр тиохроменол не оказывает.

16. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства и другое симптоматическое лечение. Возможно образование уплотнения в месте введения препарата, которое проходит самостоятельно, а также незначительное кратковременное обратимое понижение температуры тела.

17. В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных реакций. В редких случаях возможны реакции: со стороны ЦНС – кратковременное обратимое снижение двигательной активности, заторможенность. При передозировке возможно понижение температуры тела на 0,4-1°С, брадикардия, гипотония, умеренное обратимое повышение отдельных биохимических показателей крови (АЛТ, АСТ, ЩФ, ЛДГ), а также формирование безболезненного уплотнения в месте введения.

18. Запрещается смешивать препарат в одном шприце с другими лекарственными средствами.

Не рекомендуется одновременное применение препарата с другими ненаркотическими анальгетиками центрального действия.

При применении препарата в схеме мультимодальной аналгезии в комбинациях с метамизолом натрия, мелоксикамом, ИПС лидокаина увеличения частоты возникновения нежелательных явлений и побочных

эффектов при использовании в течение 24-часового периода наблюдений не отмечалось.

19. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом приеме и отмене не установлено.

20. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической и профилактической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата следует возобновить как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным

| | |
|---|---|
| Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения | ООО «АлексАнн», 141705, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13 |
| Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя | ООО «АлексАнн», 141705, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13 |

Генеральный директор ООО «АлексАнн» В.Н. Давыденков