

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

19.03.2026

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата  
Вентровитал

(Организация-разработчик: АО «Агробιοпром»,  
105064, г. Москва, ул. Казакова, д.6, стр. 1, Э 3 пом XIII комн 9,10)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-5.26-5464N/NDP-3.5.26/04174

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Вентровитал (Ventrovital).

Международное непатентованное наименование: сукральфат.

2. Лекарственная форма: суспензия для приема внутрь.

Лекарственный препарат Вентровитал содержит в 1 мл в качестве действующего вещества: сукральфат – 250 мг;

В качестве вспомогательных веществ лекарственный препарат содержит: аспасвит Ц200, бензоат натрия, сорбат калия, глицерин, ксантановую камедь и воду очищенную.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой суспензию от белого до светло-желтого цвета. При хранении допускается расслоение суспензии, исчезающее при взбалтывании.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года с даты производства, после первого вскрытия флакона лекарственный препарат хранят в защищенном от влаги и темном месте в течение 28 суток.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат Вентровитал выпускают расфасованным по 15 мл, 50 мл и 100 мл в полимерные флаконы соответствующей вместимости, герметично укупоренные навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия. Флаконы поштучно упаковывают в картонные пачки и дополнительно комплектуют шприцем-дозатором.

Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 25°C.

6. Лекарственный препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Лекарственный препарат отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Лекарственный препарат Вентровитал относится к фармакотерапевтической группе: гастропротекторные средства.

10. Сукральфат является дисахаридным комплексом с алюминия гидрохлоридом. Вступая во взаимодействие с белками некротизированной ткани язвы, формирует защитный слой, который предотвращает дальнейшее разрушающее действие пепсина, соляной кислоты и желчных солей. Снижает активность пепсина и связывает соли желчных кислот. Ингибирует активность пепсина и оказывает слабое антацидное действие.

Сукральфат, находясь в желудке и двенадцатиперстной кишке, трансформируется в полианион с множеством свободных отрицательных зарядов, которые образуют прочные связи с положительными радикалами белковоподобного экссудата (альбумин, фибриноген) слизистой оболочки. Взаимодействие с неизменной слизистой оболочкой незначительное. Сукральфат снижает всасывание фосфатов из желудочно-кишечного тракта.

При пероральном введении абсорбция сукральфата низкая - 3-5% от введенной дозы. Выводится через кишечник - 90% в неизменном виде; незначительное количество сульфатного дисахарида, попавшего в кровоток, выводится из организма почками.

Лекарственный препарат Вентровитал по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

### III. Порядок применения

11. Лекарственный препарат Вентровитал применяют с лечебной целью собакам и кошкам в качестве гастропротекторного средства при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения; симптоматические язвы; эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, связанные с приемом НПВС и ГКС; после проведения эндоскопических и хирургических манипуляций на желудочно-кишечный тракт; гиперацидный гастрит, рефлюкс-эзофагит, рефлюкс-гастрит, гастродуоденит; лекарственная язва; гиперфосфатемия у животных с уремией.

Лекарственный препарат Вентровитал применяют с профилактической целью для предупреждения образования язв в желудочно-кишечном тракте под воздействием стрессовых факторов.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам (в том числе в анамнезе); выраженная функциональная почечная недостаточность.

13. При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для ветеринарного применения. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с ним. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки глаз их необходимо промыть большим количеством воды. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании компонентов лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Лекарственный препарат применяют лактирующим самкам с осторожностью под наблюдением ветеринарного специалиста. Применение в период беременности возможно в случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Возможность применения лекарственного препарата животным в возрасте до 1 года не изучена. При необходимости применение лекарственного

препарата животным данной возрастной группы осуществляют под контролем ветеринарного врача.

15. Перед применением лекарственный препарат следует взболтать.

Лекарственный препарат Вентровитал применяют животным перорально (внутрь), натошак за 1 час до еды или через 2 часа после нее, индивидуально, принудительно вводят на корень языка в дозе 0,2 мл на 1 кг массы животного (что соответствует 50 мг сукральфата на 1 кг массы животного) каждые 10-12 часов.

Оптимальную дозу лекарственного препарата, кратность и продолжительность курса применения устанавливает ветеринарный специалист индивидуально в зависимости от показаний, тяжести заболевания и состояния животного.

16. Побочных явлений и осложнений у животных при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В редких случаях возможны: запор, тошнота, рвота, диарея, метеоризм, сонливость, гастралгия, аллергические реакции (кожный зуд, крапивница, сыпь). В этом случае необходимо прекратить применение лекарственного препарата, проконсультироваться с ветеринарным врачом и провести симптоматическую терапию.

17. Риск передозировки лекарственным препаратом маловероятен.

Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата могут проявляться угнетением, гиперсаливацией, рвотой, нарушениями дефекации.

При длительном приёме больших доз лекарственного препарата, в случае почечной недостаточности, возможно развитие интоксикации алюминием, вплоть до развития энцефалопатии (дизартрия, миоклонус, судороги, кома) и остеомалации.

В случае передозировки рекомендуется отмена приёма лекарственного препарата и проведение симптоматического лечения.

18. Не рекомендуется применять одновременно с антацидами, последние следует принимать за 30 минут до или после приёма лекарственного препарата Вентровитал.

Лекарственный препарат снижает абсорбцию тетрациклинов, циметидина, ранитидина, фторхинолонов, дигоксина, непрямых антикоагулянтов и теофиллина (интервал между их приемом должен быть не менее 2 ч).

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении или отмене не установлено.

20. Следует избегать нарушений доз и схемы применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его терапевтической эффективности. В случае пропуска очередного применения лекарственного препарата его следует применить как можно быстрее в той же дозе и по той же схеме.

21. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса  
производственных площадок  
производителя лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения.

ООО «Агробiosoнаб»,  
Российская Федерация, Московская  
область, Городской округ Балашиха,  
Новомилетское шоссе, дом 13

АО «Агробioпром»,  
Российская Федерация, Московская  
область, Городской округ Балашиха,  
Новомилетское шоссе, дом 13

Наименование, адрес  
организации, уполномоченной  
держателем или владельцем  
регистрационного  
удостоверения лекарственного  
препарата на принятие  
претензий от потребителя.

АО «Агробioпром»,  
105064, г. Москва, ул. Казакова, д.6, стр.  
1, Э 3 пом XIII комн 9,10.

Директор  
АО «Агробiosoнаб»



О.К. Чупахина