СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

01.06.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата Фунгин® таблетки

(Организация-разработчик: АО «АПИ-САН»,
119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 1А, кв. 74)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-28.25-5425 N ПВР-3-28.25/04161

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: Фунгин® таблетки (Fungin tablets);
международное непатентованное наименование: тербинафин.

2. Лекарственная форма: таблетки для приема внутрь.

Фунгин® таблетки в качестве действующего вещества содержит тербинафина гидрохлорид 225,0 мг/табл. (в пересчете на тербинафин 200,0 мг/табл.). В качестве вспомогательных веществ содержит: гипромеллозу, кроскармелозу натрия, кальция стеарат, тальк, кремния диоксид коллоидный, целлюлозу микрокристаллическую.

3. По внешнему виду препарат Фунгин® таблетки представляет собой круглые таблетки от белого до светло-желтого цвета с крестообразной риской на одной стороне.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года со дня производства.

Запрещается применение препарата Фунгин® таблетки по истечении срока годности.

4. Препарат выпускают расфасованным по 10 таблеток в блистеры из фольги алюминиевой и пленки ПВХ или по 10 и 20 таблеток в банки из полимерного материала, укупоренные полимерными крышками с контролем первого вскрытия. Каждую банку оклеивают этикетками самоклеящимися.

Блистеры упаковывают по 1 или 2 в пачку из картона. Банки упаковывают поштучно в пачку из картона. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2 °С до 25 °С.

6. Препарат Фунгин® таблетки следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Препарат Фунгин® таблетки относится к фармакотерапевтической группе противогрибковых лекарственных препаратов.

10. Тербинафин, входящий в состав препарата, представляет собой аллиламин и обладает широким спектром действия в отношении грибов, вызывающих заболевания кожи, шерсти и когтей, в т.ч. дерматофитов. В низких концентрациях оказывает фунгицидное действие на дерматофиты Trichophyton spp. и Microsporum spp, плесневые грибы (например, Aspergillus, Cladosporium, Scopulariopsis brevicaulis), дрожжевые грибы, главным образом Candida albicans. Активность в отношении дрожжевых грибов, в зависимости от их вида, может быть фунгицидной или фунгистатической.

Механизм действия тербинафина осуществляется путем ингибирования фермента скваленэпоксидазы в клеточной мембране гриба (не относится к системе цитохрома Р450). Тербинафин специфически подавляет ранний этап биосинтеза стеринов в клетке гриба. Это ведет к дефициту эргостерина и к внутриклеточному накоплению сквалена, что вызывает гибель клетки гриба. Тербинафин не оказывает влияния на метаболизм гормонов или других лекарственных препаратов.

При приеме тербинафина внутрь в коже, шерсти и когтях создаются концентрации препарата, обеспечивающие фунгицидное действие.

После однократного приема тербинафина внутрь в дозе 20 мг/кг максимальная концентрация в плазме достигается через 1,5-2 ч и составляет 2-3 мкг/мл, период выведения составляет 8-12 часов, связывание с белками плазмы крови - 99%. При одновременном приеме с пищей коррекция дозы не требуется.

Тербинафин метаболизируется в печени с образованием неактивных метаболитов. Выводится в основном почками (70%) в виде метаболитов, а также через кожу. Каких-либо доказательств кумуляции препарата в организме не имеется.

Фунгин® таблетки по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Фунгин® таблетки применяют собакам и кошкам для лечения дерматомикозов: трихофитии и микроспории, а также кандидоза, вызванного дрожжеподобными грибами Malassezia furfur и Candida albicans.

12. Противопоказаниями к применению препарата Фунгин® таблетки являются повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. С осторожностью следует применять лекарственный препарат животным с нарушением функции печени и почек.

13. При работе с препаратом Фунгин® таблетки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их следует немедленно промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Самкам в период беременности и вскармливания потомства препарат применяют под контролем ветеринарного врача на основании оценки отношения ожидаемой пользы к возможному риску его применения. Фунгин® таблетки не предназначены для применения щенкам и котятам моложе 3-месячного возраста.

15. Лекарственный препарат применяют животным перорально индивидуально, 1 раз в сутки, с кормом или вводят непосредственно на корень языка, из расчета 1 таблетка на 5-10 кг массы тела животного, что соответствует 20-40 мг тербинафина на килограмм массы тела животного.

Курс применения лекарственного препарата составляет от 3 до 6 недель в зависимости от показаний и тяжести течения заболевания, продолжительность курса применения лекарственного препарата определяет лечащий ветеринарный врач в зависимости от физиологического состояния животного и течения болезни.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. В редких случаях возможны желудочно-кишечные расстройства (снижение аппетита, рвота, диарея), тяжелое дыхание (у собак), повышение уровня трансаминаз, вялость и зуд в области морды (у кошек).

При индивидуальной повышенной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении аллергических реакций, применение препарата прекращают и животному назначают антигистаминные и симптоматические средства.

17. При передозировке препарата у животных могут наблюдаться расстройство желудочно-кишечного тракта, потеря аппетита и боль в эпигастральной области. При появлении симптомов передозировки необходимо провести промывание желудка и провести симптоматическое лечение.

18. Фунгин® таблетки не следует применять одновременно с трициклическими антидепрессантами и селективными блокаторами захвата серотонина, бета1-адреноблокаторами, противоаритмическими средствами. Лекарственные препараты-индукторы микросомальных ферментов печени (рифампицин) могут ускорять выведение тербинафина из организма. Лекарственные препараты-ингибиторы микросомальных ферментов печени (циметидин) могут замедлять метаболизм и выведение тербинафина из организма. При одновременном применении этих препаратов может потребоваться коррекция дозы тербинафина. Тербинафин снижает клиренс кофеина, в связи с чем повышается его концентрация в плазме и может повышаться токсичность.

19. Особенностей действия лекарственного препарата при первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать пропуска очередного приема препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Препарат Фунгин® таблетки не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.	ООО «Апиценна», 143921, Московская область, г. о. Балашиха, Новомилетское шоссе, дом 11.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.	ООО «Апиценна», 143921, Московская область, г. о. Балашиха, Новомилетское шоссе, дом 11. + 7 (495) 580-77-13, www.apicenna.ru, info@apicenna.ru.

Заместитель генерального директора
АО «АПИ-САН» А.А. Смирнов