

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

12.03.2026

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
Ветгаба для инъекций

(Организация-разработчик: АО «Агробιοпром»,
105064, г. Москва, ул. Казакова, д.6, стр. 1, Э 3 пом XIII комн 9,10)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-04.26-5449P-ПВР-3-04.26/04173

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Ветгаба для инъекций (Vetgaba for injection).

Международное непатентованное наименование: габапентин.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Лекарственный препарат Ветгаба для инъекций содержит в 1 мл в качестве действующего вещества: габапентин – 100 мг.

В качестве вспомогательных веществ лекарственный препарат содержит: натрия бензоат и воду для инъекций.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную бесцветную жидкость.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года с даты производства, после первого прокола пробки – не более 28 суток при указанных условиях хранения.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 10 мл, 50 мл или 100 мл во флаконы из темного стекла соответствующей вместимости, герметично укупоренные резиновыми пробками, укрепленными

алюминиевыми или комбинированными колпачками. Флаконы поштучно упаковывают в картонные пачки.

Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Лекарственный препарат следует хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2°C до 25°C.

6. Лекарственный препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Лекарственный препарат отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Лекарственный препарат Ветгаба для инъекций относится к фармакотерапевтической группе: противозепилептические средства.

10. Лекарственный препарат Ветгаба для инъекций содержит действующее вещество – габапентин, которое по строению сходно с нейротрансмиттером гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК). Точный механизм действия габапентина неизвестен, но он отличается от механизма действия других препаратов, взаимодействующих с ГАМК-рецепторами. Габапентин уменьшает гибель нейронов, способствует увеличению синтеза ГАМК, подавляет высвобождение нейротрансмиттеров моноаминовой группы, снижает поток ионов кальция, которые играют важную роль в возникновении нейропатической боли. У животных габапентин легко проникает в ткани головного мозга и предотвращает судороги, спровоцированные электрошоком, химическими конвульсантами, в том числе ингибиторами синтеза ГАМК, а также в случае генетических моделей судорожных синдромов.

После парентерального введения лекарственного препарата максимальная концентрация габапентина в плазме достигается через 1-2 ч. Биодоступность габапентина не пропорциональна дозе. Так, при увеличении дозы она снижается. Выведение лекарственного препарата из организма происходит главным образом с мочой. Клиренс габапентина из плазмы снижается у пожилых животных и больных с нарушенной функцией почек.

Лекарственный препарат Ветгаба для инъекций по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Лекарственный препарат Ветгаба для инъекций применяют собакам, кошкам и спортивным лошадям в монотерапии или в составе комплексной терапии в качестве противосудорожного, седативного и анксиолитического средства; в качестве дополнения к основной терапии для снижения нейропатической боли, в том числе послеоперационной и онкологической.

Возможно применение лекарственного препарата животным для коррекции поведенческих расстройств, купирования повышенной тревожности, страха, стресса и агрессивности при проведении стационарного лечения (в том числе хирургических вмешательств), лечебно-диагностических процедур, процедур груминга, при транспортировке.

12. Противопоказаниями к применению лекарственного препарата являются повышенная индивидуальная чувствительность животного к его компонентам (в том числе в анамнезе). Не следует применять лекарственный препарат животным с патологией почек.

Возможность применения лекарственного препарата пожилым и страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями животным определяет ветеринарный врач на основании анамнеза.

13. При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для ветеринарного применения. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с ним. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки глаз их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Возможность применения лекарственного препарата Ветгаба для инъекций беременным самкам, а также потомству животных в возрасте до 1 года не изучена.

В связи с тем, что габапентин проникает в грудное молоко, применение лекарственного препарата лактирующим самкам в период вскармливания приплода не рекомендуется.

При необходимости лекарственный препарат применяют под контролем ветеринарного врача на основании оценки соотношения ожидаемой пользы для матери к потенциальному риску для потомства.

15. Лекарственный препарат Ветгаба для инъекций применяют спортивным лошадям, собакам и кошкам внутривенно, внутримышечно или подкожно с соблюдением правил асептики и антисептики.

При судорогах лекарственный препарат применяют животным каждые 8 часов в дозе: спортивным лошадям – от 5 до 10 мг габапентина/кг массы тела животного, собакам и кошкам - от 10 до 20 мг габапентина/кг массы тела животного. Некоторым животным может потребоваться более высокая доза габапентина. Длительность применения лекарственного препарата при судорогах устанавливает ветеринарный врач.

При нейропатической боли лекарственный препарат применяют каждые 12 часов в дозе: спортивным лошадям - от 2,5 до 7,5 мг габапентина/кг массы тела животного, собакам и кошкам - от 5 до 15 мг габапентина/кг массы тела животного. При необходимости дозу постепенно увеличивают: спортивным лошадям – до 15 мг/кг массы тела животного, кошкам и собакам - до 30 мг габапентина/кг массы тела животного, при этом лекарственный препарат применяют каждые 8-12 часов. Длительность применения лекарственного препарата при нейропатической боли устанавливает ветеринарный врач, но она не должна превышать 14 дней.

Для коррекции поведенческих расстройств, купирования повышенной тревожности, страха, стресса и агрессивности при проведении стационарного лечения (в том числе хирургических вмешательств), лечебно-диагностических процедур, процедур груминга, при транспортировке лекарственный препарат применяют каждые 12 часов в дозе: спортивным лошадям – от 2,5 до 15 мг габапентина/кг массы тела животного, собакам и кошкам - от 5 до 30 мг габапентина/кг массы тела животного. Длительность применения лекарственного препарата при указанных обстоятельствах устанавливает ветеринарный врач.

Краткосрочную терапию лекарственным препаратом проводят перед событием, которое может вызвать сильный стресс, агрессивность, тревожность и беспокойство у животного, с целью достижения анксиолитического эффекта. Лекарственный препарат применяют за 1,5 часа до события в дозах: спортивным лошадям – от 10 до 15 мг габапентина/кг массы тела животного, кошкам – от 20 до 30 мг габапентина/кг массы тела животного, собакам – от 30 до 60 мг габапентина/кг массы тела животного. Следует учитывать, что максимальный эффект габапентина может быть достигнут через 1-2 часа после применения лекарственного препарата.

При применении внутривенно требуемую дозу лекарственного препарата вводят медленно.

Возможно применение лекарственного препарата в виде инфузии с постоянной скоростью. Для проведения инфузии допускается смешивание лекарственного препарата только с физиологическим раствором.

Для определения оптимальной дозы применение лекарственного препарата необходимо начинать с минимальной дозы и повышать до достижения желаемого эффекта без побочных эффектов.

Оптимальную дозу лекарственного препарата, кратность и продолжительность курса применения устанавливает ветеринарный специалист индивидуально в зависимости от показаний, тяжести заболевания и состояния животного.

При необходимости снизить дозу, отменить лекарственный препарат или заменить его на альтернативный, если он применялся более 14 дней, делать это следует осторожно, постепенно снижая дозу в течение минимум одной недели.

Если животному планируется проведение анестезии, следует рассмотреть возможность применения более низких доз анестетика или седативного средства, используемого для анестезии.

Лекарственный препарат может быть использован для купирования нейропатической боли в комбинации с нестероидными противовоспалительными препаратами.

16. Побочных явлений и осложнений у животных при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и развитии аллергических реакций его применение следует прекратить и провести десенсибилизирующую терапию.

17. При значительной передозировке препарата у животного может наблюдаться угнетенное состояние, сонливость, вялость, атаксия, заторможенность движений, нарушение походки, тремор, летаргия и расстройства желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота и диарея). При возникновении любого из перечисленных симптомов использование лекарственного препарата прекращают, при необходимости назначают животному средства симптоматической терапии.

18. Лекарственный препарат может применяться в составе комплексной терапии с другими патогенетическими средствами, в том числе с нестероидными противовоспалительными препаратами и опиоидными анальгетиками.

Допускается смешивание лекарственного препарата с физиологическим раствором.

С осторожностью следует назначать габапентин с лекарственными препаратами, подавляющими ЦНС, включая опиоидные анальгетики.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении или отмене не установлено.

20. Следует избегать нарушений доз и курса применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его терапевтической эффективности. В случае пропуска очередного применения лекарственного препарата его следует применить как можно быстрее в той же дозе и по той же схеме.

21. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса
производственных площадок
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

ООО «Агробiosoнаб»,
Российская Федерация, Московская
область, Городской округ Балашиха,
Новомилетское шоссе, дом 13

АО «Агробioпром»,
Российская Федерация, Московская
область, Городской округ Балашиха,
Новомилетское шоссе, дом 13

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий
от потребителя.

АО «Агробioпром»,
105064, г. Москва, ул. Казакова, д.6,
стр. 1, Э 3 пом XIII комн 9,10.

Директор
АО «Агробioпром»

О.К. Чупахина

