СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

25.05.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Визотиум
(организация-разработчик: ООО «НИТА-ФАРМ», 410010, г. Саратов,
ул. им. Осипова В.И., д. 1)

Номер регистрационного удостоверения: 44-3-09.26-5524/ПВР-3-09.26/0419.

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

- торговое наименование: Визотиум (Vizotium);
- международное непатентованное наименование - левофлоксацин.

2. Лекарственная форма: капли глазные.

Визотиум в качестве действующего вещества в 1 мл содержит левофлоксацин (в форме гемигидрата) 5 мг, а также вспомогательные вещества: метилпарабен, пропилпарабен, гиалуронат натрия, хлорид натрия, соляную кислоту и воду для инъекций.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную жидкость от слабо-желтого до зеленовато-желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года с даты производства; после первого вскрытия флакона 28 суток.

Запрещается применение лекарственного препарата Визотиум по истечении срока годности.

4. Визотиум выпускают расфасованным по 5 мл и 10 мл в стеклянные флаконы, укупоренные навинчиваемыми полимерными крышками с контролем первого вскрытия, снабженными стеклянной пипеткой или в полимерные флаконы, укупоренные навинчиваемыми полимерными крышками с контролем первого вскрытия, снабженными полимерными пробками-капельницами. Флаконы с препаратом упаковывают в индивидуальные пачки из картона.

Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению препарата.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 2°С до 25°С.

6. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается по рецепту на лекарственный препарат или требованию ветеринарной организации.

II. Фармакологические свойства

9. Визотиум относится к фармакотерапевтической группе - офтальмологические средства.

10. Левофлоксацин, входящий в состав препарата, является антибактериальным средством из группы фторхинолонов III поколения и оказывает бактерицидное действие. Обладая широким спектром антимикробной активности, левофлоксацин эффективен в отношении большинства клинически значимых возбудителей бактериальных инфекций глаз у собак и кошек, включая: Грамположительные аэробы: *Staphylococcus spp.* (включая метициллин-чувствительные штаммы *S. aureus, S. pseudintermedius*), *Streptococcus spp.* Грамотрицательные аэробы: *Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp.* (включая *P. mirabilis* и *P. vulgaris*), *Pasteurella spp., Acinetobacter spp., Enterobacter spp., Serratia spp.*

Внутриклеточные и атипичные микроорганизмы: *Chlamydia spp.* (включая *Chlamydia felis), Mycoplasma spp.* (включая *Mycoplasma felis*).

Механизм действия левофлоксацина связан с ингибированием двух ключевых ферментов бактериальной клетки — ДНК-гиразы (топоизомеразы II) и топоизомеразы IV. Блокирование этих ферментов нарушает процессы репликации, суперспирализации и разделения дочерних молекул ДНК, что приводит к необратимым повреждениям и гибели бактериальной клетки.

При местном применении в форме глазных капель левофлоксацин хорошо проникает в ткани глаза, создавая терапевтические концентрации в роговице, конъюнктиве и водянистой влаге передней камеры глаза через 30–60 минут после инстилляции. Препарат выводится преимущественно со слезной жидкостью.

Визотиум по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Визотиум применяют собакам и кошкам для лечения острых и хронических бактериальных инфекций глаз и его придатков, вызванных чувствительными к левофлоксацину микроорганизмами, в том числе при бактериальном блефарите, конъюнктивите, блефароконъюнктивите, бактериальном кератите и кератоконъюнктивите, дакриоцистите, мейбомиите, септической (инфицированной) язве роговицы, бактериальном иридоциклите, хламидийном конъюнктивите (в составе комплексной терапии), а также для лечения вторичных бактериальных инфекций, развивающихся на фоне вирусных поражений глаз (например, при герпесвирусе кошек). Препарат

также применяют для превентивного лечения состояний, связанных с неизбежной бактериальной контаминацией: при попадании инородного тела, проникающих ранениях глаза, травмах с нарушением целостности тканей и в периоперационный период при хирургических вмешательствах на глазном яблоке и веках.

12. Противопоказанием к применению препарата Визотиум является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата.

13. При работе с препаратом Визотиум следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Визотиум. По окончании работы с препаратом руки следует вымыть теплой водой с мылом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Возможность применения лекарственного препарата животным в период беременности и лактации, а также потомству определяет лечащий врач на основании оценки соответствия пользы к возможному риску его применения.

15. Визотиум применяют кошкам и собакам путем закапывания 1-2 капли в конъюнктивальный мешок пораженного глаза. При наличии обильного гнойного или слизисто-гнойного отделяемого предварительно проводят туалет глаза: закапывают 3-4 капли препарата, удаляют экссудат стерильным марлевым тампоном, после чего проводят инстилляцию терапевтической дозы препарата.

Режим дозирования:

Заболевание / Состояние	**Кратность применения**		**Общая продолжительность терапии**
	острая фаза (1-3 дня)	**дальнейшее лечение (до выздоровления)**	
Бактериальный конъюнктивит, блефароконъюнктивит	4-6 раз в день (каждые 6-4 часа)	3-4 раза в день	7-14 дней
Бактериальный блефарит, мейбомиит	3-4 раза в день (каждые 8-6 часов)		14-21 день

Заболевание / Состояние	Кратность применения		Общая продолжительность терапии
	острая фаза (1-3 дня)	дальнейшее лечение (до выздоровления)	
Бактериальный кератит, кератоконъюнктивит	4-6 раз в день (каждые 6-4 часа)	3-4 раза в день (каждые 8-6 часов)	от 14 до 28 дней*
Септическая (инфицированная) язва роговицы	Каждый 30-60 мин в первые 2 часа, далее каждые 2-4 часа	4-6 раз в день (каждые 6-4 часа)	
Бактериальный иридоциклит	4-6 раз в день (каждые 6-4 часов)	3-4 раза в день (каждые 8-6 часов)	7-14 дней
Хламидийный конъюнктивит (в составе комплексной терапии)	4-6 раз в день (каждые 6-4 часа)	3-4 раза в день (каждые 8-6 часов)	10- 14 дней
Дакриоцистит (острый)			
Вторичная бактериальная инфекция при вирусных поражениях	3-4 раз в день (каждые 8-6 часов)		5-7 дней
Профилактика при проникающих ранениях, травмах	4-6 раз в день (каждые 6-4 часа)	3-4 раза в день (каждые 8-6 часов)	7-10 дней
Периоперационная профилактика (до/после операции)	3-4 раза в день (каждые 8-6 часов) за 1-3 дня до операции	3-4 раза в день (каждые 8-6 часов) в течение 7-14 дней после операции	8-17 дней

Особые указания:

* При кератитах и язвах роговицы продолжительность лечения определяется до полной эпителизации под контролем ветеринарного врача.

Доза препарата, кратность применения и продолжительность курса лечения устанавливается ветеринарным врачом индивидуально в зависимости от показаний, тяжести заболевания и состояния животного. При хронических и осложненных процессах может быть рекомендована комплексная терапия.

После использования флакон следует плотно закрывать. Во избежание контаминации раствора не допускать контакта кончика пипетки с поверхностью глаза, веками или иными поверхностями.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений не наблюдается. В редких случаях препарат

может вызывать легкую болезненность и гиперемию конъюнктивы, зуд, слезотечение, которые, как правило, носят временный характер и самостоятельно купируются. В случае появления у животных аллергических реакций (продолжается или нарастает конъюнктивальная гиперемия) использование препарата прекращают.

17. Симптомов передозировки препаратом не установлено.

18. При комбинированной терапии с другими офтальмологическими препаратами интервал между их введением должен составлять не менее 10 минут, глазные мази и гели применяются последними. При одновременном применении с системными фторхинолонами учитывают возможность потенцирования системных эффектов. Препарат совместим с топическими глюкокортикостероидами, нестероидными противовоспалительными средствами и кератопротекторами.

19. Особенностей действия лекарственного препарата в начале приема и его отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе по той же схеме.

21. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения	ООО «НИТА-ФАРМ»; 410010, г. Саратов, ул.им. Осипова В.И., д. 1.
Наименование и адрес организации, уполномоченной владельцем или держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя	ООО «НИТА-ФАРМ»; 410010, г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д. 1.

Начальник ОРиС Васильченко Д.И.