

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н. А. ВЛАСОВ

06.03.2019

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Мастьет Форте

(Организация-разработчик: компания «Интервет Интернешнл Б.В.», Вим Де Кёрверстраат 35, а/я 31 5830 АА Боксмеер, Нидерланды/ Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer, The Netherlands)

Номер регистрационного удостоверения: *528-3-36.12 -1198N/7B4-3-0.2/0109*

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: Мастьет Форте (Mastijet[®] Forte),

международное непатентованное наименование: тетрациклин, неомицин, бацитрацин, преднизолон.

2. Лекарственная форма: суспензия для интрацистернального введения.

Мастьет Форте в 1 шприце-дозаторе в качестве действующих веществ содержит: 200 мг тетрациклина (в форме гидрохлорида), 250 мг неомицина (в форме сульфата), 2000 МЕ бацитрацина и 10 мг преднизолона, в качестве вспомогательных веществ – стеарат магния и вазелиновое масло.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой маслянистую суспензию желтоватого цвета.

Срок годности Мастьет Форте при соблюдении условий хранения и транспортирования 24 месяца со дня производства.

Мастьет Форте запрещается применять по истечении срока годности.

4. Мастьет Форте выпускают расфасованным по 8 г в пластиковые шприцы-дозаторы одноразового применения, наконечники которых снабжены защитными колпачками. Шприцы-дозаторы упаковывают по 20 штук в картонные коробки вместе с очищающими салфетками и инструкцией по применению.

5. Мастьет Форте хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2°C до 8°C.

6. Мастьет Форте следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Мастьет Форте отпускают без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Мاستиет Форте относится к комбинированным антибактериальным лекарственным препаратам.

10. Комбинация антибиотиков, входящих в состав Мاستиет Форте, обладает широким спектром антибактериального действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, наиболее часто выделяемых при мастите коров, в том числе *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus disagalactiae*, *Streptococci uberis*, *Klebsiella spp*, *Arcanobacterium pyogenes*, *Escherichia coli*.

Механизм действия входящих в состав препарата тетрациклина и неомицина заключается в ингибировании синтеза белков в бактериальной клетке.

Бацитрацин, проникая в бактериальную клетку, связывается с рецепторами на ее внутренней поверхности и нарушает синтез пептидогликана – основного компонента клеточной стенки.

Преднизолон – глюкокортикостероид, обладая противовоспалительным и противоаллергенным действием, позволяет максимально снизить воспалительную реакцию и отечность тканей вымени. При введении лекарственного препарата в молочные цистерны действующие вещества проникают в паренхиму вымени, сохраняясь в терапевтических концентрациях на протяжении 12 часов.

Мастиет Форте по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76) и не оказывает раздражающего действия на ткани вымени.

III. Порядок применения

11. Мاستиет Форте предназначен для лечения клинической и субклинической форм мастита бактериальной этиологии у коров в период лактации.

12. Противопоказанием для применения является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Не рекомендуется применять Мاستиет Форте коровам в период сухостоя, а также использовать очищающие салфетки для обработки сосков вымени с открытыми ранами.

13. При работе с Мاستиет Форте следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для ветеринарного применения. Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. Все лица во время работы с Мастеиет Форте должны быть одеты в спецодежду и обеспечены индивидуальными средствами защиты. В местах работы должна быть аптечка доврачебной помощи. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мастеиет Форте.

По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом и переодеться. Запрещается использование пустых шприцев-дозаторов из-под лекарственного препарата для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками, их необходимо промыть большим количеством чистой воды. В случае проявления аллергической реакции или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Отсутствуют противопоказания к применению Мاستиет Форте в период беременности и лактации. Не рекомендуется применять лекарственный препарат за 2 месяца до отела.

15. Мاستиет Форте вводят в пораженную четверть вымени коровы в разовой дозе 8 г (содержимое 1 шприца-дозатора) 3-4-кратно с интервалом 12 часов.

Перед применением лекарственного препарата четверть вымени полностью освобождают от молока, дезинфицируют кончик соска прилагаемой очищающей салфеткой. Затем удаляют верхушку защитного колпачка с наконечника шприца-дозатора, вводят наконечник в молочный канал (на 5 мм) или удаляют колпачок полностью и вводят наконечник в сосковый канал на всю его длину. Предпочтительным способом является частичное введение, при невозможности его выполнения наконечник шприца-дозатора вводят на всю его длину, при этом эффективность лечения не снижается. Содержимое шприца-дозатора (1 доза) осторожно выдавливают в четверть вымени; извлекают шприц-дозатор, пережимают верхушку соска и массируют сосок снизу вверх для лучшего распределения лекарственного препарата.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Мاستиет Форте в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении признаков аллергии, применение Мاستиет Форте прекращают и животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. Симптомы передозировки при применении Мاستиет Форте не выявлены.

18. Применение Мاستиет Форте не исключает использование других лекарственных средств для животных, за исключением препаратов для интрацестерального введения.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы, применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

21. Сроки возможного использования продукции животного происхождения после последнего применения Мاستиет Форте составляют: молоко – 7,5 дней (15 доек), мясо – 64 дня.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

Интервет Интернешнл Б.В. (Вим Де
Кёрверстраат 35, 5831 AN Боксmeer,
Нидерланды) / Intervet International
B.V. (Wim de Körverstraat 35, 5831 AN
Boxmeer, The Netherlands).

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя.

ООО «Интервет» (Россия, 143345,
Московская область, Наро-
Фоминский район, пос. Селятино, ул.
Промышленная, дом 81/1).

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по
ветеринарному применению лекарственного препарата Мاستиет Форте,
согласованная Россельхознадзором 23.05.2017 г.