

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н.А. ВЛАСОВ

29.03.2019

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата *Мексидол-Вет*[®]

(Организация - разработчик: ООО «НПК «ФАРМАСОФТ»,
Россия, 115407, город Москва, улица Судостроительная,
дом 41, этаж 1, помещение 12)

Номер регистрационного удостоверения:

74-3-12.12-4442 N17BP-3-5.6/01731

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мексидол-Вет[®]
Группировочное наименование: Этилметилгидроксипиридина
сукцинат
2. Лекарственная форма: таблетки
Состав на одну таблетку в дозировке 50 мг:
Действующее вещество: этилметилгидроксипиридина сукцинат -
50 мг;
Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, лактозы
моногидрат, повидон, кросповидон, кремния диоксид коллоидный, магния
стеарат.
Состав на одну таблетку в дозировке 125 мг:
Действующее вещество: этилметилгидроксипиридина сукцинат -
125 мг;
Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая,
лактозы моногидрат, повидон, кросповидон, кремния диоксид коллоидный,
магния стеарат.
3. По внешнему виду препарат представляет собой таблетки от белого до
белого с кремоватым оттенком цвета плоскоцилиндрической формы с
фаской. На каждой таблетке риска.
Срок годности препарата - 3 года. Не применять по истечении срока
годности.
4. Препарат выпускают по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из
пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.
По 1, 2, 3, 4 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по
применению упаковывают в картонную пачку.

5. Препарат хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 2 °С до 25 °С.

6. Мексидол-Вет® следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Мексидол-Вет® относится к фармакотерапевтической группе антигипоксантов и антиоксидантов.

10. Мексидол-Вет® обладает выраженными антиоксидантными, антигипоксическими и мембранопротекторными свойствами. Этилметилгидроксипиридина сукцинат, входящий в состав препарата, повышает устойчивость организма к воздействию свободных радикалов и является ингибитором свободнорадикальных процессов. Мексидол-Вет® повышает резистентность организма к воздействию различных повреждающих факторов, приводящих к кислородозависимым патологическим состояниям (шок, гипоксия, ишемия и нарушения мозгового кровообращения). Препарат улучшает микроциркуляцию и реологические свойства крови, стабилизирует мембранные структуры тромбоцитов и эритроцитов при гемолизе, обладает гиполипидемическим действием, снижает содержание общего холестерина и липопротеидов низкой плотности.

Мексидол-Вет® ингибирует перекисное окисление липидов, повышает активность супероксиддисмутазы, улучшает синаптическую передачу и транспорт медиаторов.

Механизм действия препарата заключается в способности усиливать компенсаторную активацию аэробного гликолиза и снижать степень угнетения окислительных процессов в цикле Кребса в условиях гипоксии, активизировать энергосинтезирующую функцию митохондрий, одновременно увеличивая содержание АТФ и креатинфосфата.

При пероральном введении препарат быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и поступает в кровь, органы и ткани животного. Выводится из организма преимущественно с мочой, в основном в глюкуроноконъюгированной форме.

Мексидол-Вет® по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает местно-раздражающими, кумулятивными, эмбриотоксическими и тератогенными свойствами.

III. Порядок применения

11. Мексидол-Вет[®] назначают собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью самостоятельно и в комплексной терапии:

- при острой и хронической сердечно-сосудистой и сердечно-легочной недостаточности;
- с целью профилактики наркозных и постнаркозных осложнений;
- в посттравматический и послеоперационный периоды;
- при патологии кожных покровов (дерматиты, в том числе связанные с нарушением периферического кровообращения, экземы, трофические язвы, раны), для улучшения состояния кожно-волосного покрова;
- в периоды экстремальных нагрузок, в том числе связанных с адаптацией животных к новым условиям (транспортировка, участие в выставках и соревнованиях);
- при экзогенно-органических заболеваниях головного мозга (в результате перенесенных нейроинфекций);
- при острых нарушениях мозгового кровообращения;
- при эпилепсии, эписиндроме;
- при черепно-мозговых травмах;
- при возрастных нарушениях функций организма (вялотекущие хронические заболевания, нейродермиты).

12. Противопоказания для применения: острые нарушения функции печени и почек, повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

13. При работе с препаратом Мексидол-Вет[®] следует соблюдать общие правила техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Мексидол-Вет[®]. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата).

14. Применение препарата беременным и кормящим животным, щенкам и котятм до 2-х месячного возраста при необходимости проводят под наблюдением ветеринарного врача.

15. Дозу, продолжительность курса лечения и кратность применения препарата Мексидол-Вет[®] назначает лечащий ветеринарный врач в зависимости от физиологического состояния животного и течения болезни.

Мексидол-Вет[®] назначают собакам и кошкам перорально после кормления. Доза лекарственного препарата зависит от тяжести клинического состояния животного. В острый период заболевания терапевтическая доза

составляет 10-15 мг действующего вещества на 1 кг массы животного в сутки, затем ее снижают до 5,0-7,5 мг на 1 кг массы животного.

При лечении сердечно-сосудистой и сердечно-легочной недостаточности Мексидол-Вет[®] применяют по 10-15 мг действующего вещества на 1 кг массы животного 2-3 раза в сутки в течение 7-10 дней, затем дозу лекарственного препарата снижают в 2 раза и применяют в течение 10-14 дней.

При хронической патологии для поддержания терапевтического эффекта рекомендуется периодический прием лекарственного препарата 2-4 раза в год курсами по 3 недели по 5,0-7,5 мг действующего вещества на 1 кг массы животного 2 раза в сутки.

В целях профилактики наркозных и постнаркозных осложнений препарат применяют за 2-3 дня до операции, в послеоперационный период – в течение 2-3 дней два раза в сутки.

При транспортировке, участии в выставках и соревнованиях Мексидол-Вет[®] назначают в терапевтической дозе 5,0 – 7,5 мг на 1 кг массы животного 2-3 раза в сутки в течение 3-5 дней до предполагаемого мероприятия.

В качестве лечебно-профилактического средства Мексидол-Вет[®] назначают собакам и кошкам старше 7 лет в дозе 5 мг действующего вещества на 1 кг массы животного два раза в сутки в течение 15-30 дней с интервалом 3-4 месяца.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

17. При передозировке возможно развитие сонливости. При появлении симптомов передозировки препарат временно отменяют.

18. Применение препарата Мексидол-Вет[®] не исключает использования других лекарственных средств патогенетической и симптоматической терапии.

19. Особенности действия при первом приеме препарата или при его отмене не выявлено.

20. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс лечения необходимо возобновить в соответствии с предусмотренной схемой применения и дозировками.

21. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения:

ЗАО «ЗиО-Здоровье», Россия, 142103,
Московская обл., г. Подольск,
ул. Железнодорожная, д. 2
Тел.: +7 (495) 642-05-42
Факс: +7 (495) 642-05-43

Наименование и адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя:

ООО «НПК «ФАРМАСОФТ»,
Россия, 115407, город Москва,
улица Судостроительная, дом 41,
этаж 1, помещение 12
Тел./факс: +7 (495) 626-47-55