

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Н.А. ВЛАСОВ

26.03.2019

ИНСТРУКЦИЯ  
по ветеринарному применению лекарственного препарата  
Мильбемакс® таблетки для кошек

(Организация-разработчик: «Elanco Europe Ltd», Lilly House, Priestley Road, Basingstoke, Hampshire RG24 9NL, UK / «Эланко Юороп Лтд», Лилли Хаус, Пристли Роуд, г. Бейсингсток, графство Гэмпшир, RG24 9NL, Великобритания)

Номер регистрационного удостоверения: 828-3-Р3.13-4439 N/7ВЦ-3-4, №02353

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мильбемакс® таблетки для кошек (Milbemax® tablets for cats).

Международные непатентованные наименования действующих веществ: мильбемицин, празиквантел.

2. Лекарственная форма: таблетки для перорального применения.

Мильбемакс® таблетки для кошек в качестве действующих веществ содержит мильбемицина оксим и празиквантел. Выпускают препарат в двух модификациях: «Мильбемакс® таблетки для котят и маленьких кошек» с содержанием мильбемицина оксима – 4 мг/табл. и празиквантела – 10 мг/табл. и «Мильбемакс® таблетки для крупных кошек» с содержанием мильбемицина оксима – 16 мг/табл. и празиквантела – 40 мг/табл.

В качестве вспомогательных веществ Мильбемакс® таблетки для кошек содержит: микрокристаллическую целлюлозу, натрия кармелозу, повидон, лактозу, кремний коллоидный, магния стеарат, гипромелозу, макрогол и тальк, пищевую добавку со вкусом говядины (Artificial beef flavour), оксид железа (краситель в «Мильбемакс® таблетки для крупных кошек»).

3. По внешнему виду «Мильбемакс® таблетки для котят и маленьких кошек» представляет собой таблетки от бежевого до коричневого цвета, овальной формы с оттиском «ВС» на одной стороне и оттиском «НА» на другой стороне, с линией разлома с обеих сторон; «Мильбемакс® таблетки для крупных кошек» представляет собой таблетки от красного до красно-коричневого цвета, овальной формы с оттиском «КК» на одной стороне и оттиском «НА» на другой стороне, с линией разлома с обеих сторон.

Срок годности Мильбемакс® таблетки для кошек при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года со дня производства.

Неиспользованную половину таблетки можно поместить в блистер и хранить до следующей дегельминтизации, но не более 6 месяцев после вскрытия упаковки.

Не применять по истечении срока годности.

4. Препарат выпускают расфасованным по 2 таблетки в блистеры из алюминиевой фольги, помещенные по 1 или 2 блистера в картонную пачку.
5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре не выше 25°C.
6. Хранить в недоступном для детей месте.
7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Мильбемакс® таблетки для кошек относится к фармакотерапевтической группе: антигельминтные средства в комбинациях.
10. Мильбемицина оксим, входящий в состав препарата, – макроциклический лактон, получаемый в результате ферментативной деятельности *Streptomyces hygroscopicus* var. *Aureolacrimosus*, активен в отношении личинок и имаго нематод, паразитирующих в желудочно-кишечном тракте кошек, а также личинок нематоды *Dirofilaria immitis*.

Механизм действия мильбемицина обусловлен повышением проницаемости клеточных мембран для ионов хлора ( $\text{Cl}^-$ ), что приводит к сверхполаризации мембран клеток нервной и мышечной ткани, параличу и гибели паразита. После перорального введения препарата максимальная концентрация мильбемицина оксима в плазме крови кошек достигается через 2 часа, из организма соединение выводится в основном в неизмененном виде, период полувыведения составляет около 13 часов.

Празиквантел является ацилированным производным пиразин-изохинолина, обладает выраженным действием против цестод и нематод. Повышенная проницаемость клеточных мембран паразита для ионов кальция ( $\text{Ca}^{2+}$ ), вызывает деполяризацию мембран, сокращение мускулатуры и разрушение тегумента, что приводит к гибели паразита и способствует его выведению из организма животного. После перорального введения препарата максимальная концентрация празиквантела в плазме крови кошек достигается через 1 час, из организма соединение выводится в основном в виде неактивных метаболитов с мочой, период полувыведения составляет около 3 часов.

Мильбемакс® таблетки для кошек по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают сенсибилизирующего, эмбриотоксического и тератогенного действия, хорошо переносится кошками разных пород и разного возраста. Препарат токсичен для рыб и других гидробионтов.

## III. Порядок применения

11. Мильбемакс® таблетки для кошек назначают с лечебной и профилактической целью при нематодозах, цестодозах и смешанных нематодо-цестодозных инвазиях, вызванных как личиночными формами, так и половозрелыми цестодами и нематодами следующих видов:

цестоды – *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., *Echinococcus multilocularis*;

нematоды – *Ancylostoma tubaeforme*, *Toxocara cati*, *Dirofilaria immitis* (профилактика заболевания в течение 1 месяца).

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе) и выраженные нарушения функции почек и печени.

Не следует применять «Мильбемакс® таблетки для котят и маленьких кошек» животным массой менее 0,5 кг, «Мильбемакс® таблетки для крупных кошек» – животным массой менее 2 кг.

Не подлежат дегельминтизации истощенные и больные инфекционными болезнями животные.

13. При работе с Мильбемакс® таблетки для кошек необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мильбемакс® таблетки для кошек.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды.

В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Не следует применять «Мильбемакс® таблетки для котят и маленьких кошек» котятам моложе 6-недельного возраста. Препарат можно использовать беременным и лактирующим животным.

15. Препарат применяют кошкам однократно во время кормления с небольшим количеством корма или вводят принудительно на корень языка после кормления в минимальной терапевтической дозе 2 мг мильбемицина оксима и 5 мг празиквантаря на 1 кг массы животного, из расчета:

Масса животного	Мильбемакс® таблетки для котят и маленьких кошек (от бежевого до коричневого цвета)	Мильбемакс® таблетки для крупных кошек (от красного до красно-коричневого цвета)
0,5 – 1 кг	½ таблетки	-
> 1 – 2 кг	1 таблетка	-
> 2 – 4 кг	-	½ таблетки
> 4 – 8 кг	-	1 таблетка
> 8 – 12 кг	-	1 ½ таблетки

Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств перед дегельминтизацией не требуется.

С лечебной целью кошек дегельминтизируют по показаниям, с профилактической целью – ежеквартально, а также перед каждой вакцинацией и случкой в терапевтической дозе.

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата согласно настоящей инструкции, как правило, не наблюдается.

У некоторых кошек (чаще у котят), могут наблюдаться вялость, атаксия, трепор мышц, рвота и/или диарея. В этих случаях применение препарата прекращают и животному назначают средства симптоматической терапии.

17. При передозировке препарата у некоторых кошек может наблюдаться трепор, симптомы которого самопроизвольно исчезают в течение суток и не требуют применения лекарственных средств.

18. Мильбемакс® таблетки для кошек совместим с селамектином, сведения о совместимости препарата с другими макроциклическими лактонами отсутствуют.

19. Особеностей действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. При проведении дегельминтизации следует придерживаться рекомендуемых инструкцией сроков. В случае пропуска очередной обработки применение препарата возобновляют в той же дозе по той же схеме.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименования производственных производителя препарата для применения.	и адреса площадок лекарственного ветеринарного	Организация-производитель: «Elanco France SAS» / «Эланко Франс САС», 26, rue de la Chapelle, F-68330 Huningue, France / 26, рю де ла Шапелль, F-68330, Юнинг, Франция. Альтернативная организация, ответственная за упаковку: Ivers-Lee AG / Иверс-Ли АГ, Kirchbergstrasse 160, 3400 Burgdorf, Switzerland / Кирхбергстрассе 160, 3400 Бургдорф, Швейцария
---	--	---

Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем удостоверения препарата на принятие претензий от потребителя.	должателем или регистрационного лекарственного	ООО «Эланко Рус», 123112, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, 10.
--	--	--