

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Стоп-стресс® таблетки 2 и 5

(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН»,
119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 1А, кв. 74)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-15.18-4369 № ПВР-3-4.6/01690

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: Стоп-стресс® таблетки 2 и 5 (Stop-stress tablets 2 and 5);
международное непатентованное наименование: аминифенилмасляная кислота.

2. Лекарственная форма: таблетки для приема внутрь.

Лекарственный препарат выпускают в двух дозировках: Стоп – стресс® таблетки 2 и Стоп – стресс® таблетки 5, содержащих в 1 таблетке в качестве действующих веществ соответственно: аминифенилмасляную кислоту (фенибут) – 100,0 мг и 250,0 мг, экстракт шлемника – 10,0 мг и 30,0 мг, экстракт хмеля – 10,0 мг и 30,0 мг, экстракт пустырника – 10,0 мг и 30,0 мг, экстракт пиона – 10,0 мг и 30,0 мг, в качестве вспомогательных веществ – лактозу безводную, кальция стеарат, аспасвит Ц 200 и целлюлозу микрокристаллическую.

3. По внешнему виду препарат представляет собой плоские таблетки круглой формы и разделительной бороздкой с одной стороны от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с вкраплениями. Допускается оттиск логотипа компании (А) на другой стороне таблетки.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства.

Запрещается применять лекарственный препарат по истечении срока годности.

4. Препарат выпускают расфасованным по 15 и по 20 таблеток в полимерные банки, укупоренные пластмассовыми крышками с контролем первого вскрытия или по 10 таблеток в блистеры из металлополимерного материала. Каждую банку оклеивают этикетками самоклеящимися. Банки упаковывают поштучно в пачку из картона. Блистеры упаковывают по 1 или 2 в пачку из картона. Каждую потребительскую упаковку препарата комплектуют инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2 °С до 25 °С.

6. Стоп-стресс® таблетки 2 и 5 следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается по рецепту на лекарственный препарат или требованию ветеринарной организации.

II. Фармакологические свойства

9. Стоп-стресс® таблетки 2 и 5 относятся к группе седативных лекарственных средств в комбинации.

10. Комбинация активных компонентов препарата оказывает на животных успокаивающее действие, уменьшает напряженность, страх, улучшает восстановительные и адаптивные процессы, повышает устойчивость к неблагоприятным воздействиям внешней среды.

Фенибут является фенильным производным ГАМК и фенилэтиламина (γ -амино- β -фенилмасляной кислоты гидрохлорид), усиливая тормозящие ГАМК-эргические процессы, воздействует на функциональное состояние за счет нормализации метаболизма и влияния на мозговое кровообращение. Обладая выраженным стресс-корректорным действием, обеспечивает нормализацию процессов возбуждения и торможения в центральной нервной системе. Экстракты лекарственных растений оказывают на животное мягкое успокаивающее действие. Шишки хмеля обладают успокаивающим, обезболивающим, снотворным и противовоспалительным действием, его нейротропные свойства связывают с содержанием лупулина, который проявляет успокаивающее действие на центральную нервную систему. Пустырник уменьшает возбудимость центральной нервной системы, оказывает спазмолитическое, противосудорожное действие, замедляет ритм и увеличивает силу сердечных сокращений, оказывает гипотензивное действие. Экстракт пиона содержит фенолы, дубильные вещества, органические кислоты, которые в совокупности повышают сопротивляемость организма к гипоксии, обладают спазмолитическими, противосудорожными, антимикробными свойствами. Экстракт шлемника оказывает успокаивающее действие, улучшает сон, по седативному эффекту превосходит пустырник и валериану.

Стоп-стресс® таблетки 2 и 5 по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают мутагенного, канцерогенного и sensibilizing действия.

III. Порядок применения

11. Стоп-стресс® таблетки 2 и 5 применяют для снижения возбуждения и коррекции психогенных нарушений поведения у кошек и собак при стрессах, фобиях, агрессии без видимых причин и при повышенном половом возбуждении (совместно с контрацептивными лекарственными средствами).

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе), заболевания мочеполовой системы, опухоли и диабет.

13. При работе с препаратом Стоп-стресс® таблетки 2 и 5 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта со Стоп-стресс® таблетками 2 и 5. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Запрещается использовать пустую тару из-под препарата для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Не следует применять Стоп-стресс® таблетки 2 и 5 самкам в период беременности и вскармливания потомства. В случае необходимости применения

препарата самкам в период вскармливания потомства, кормление котят и щенков материнским молоком прерывают.

15. Стоп-стресс® таблетки 2 и 5 применяют кошкам и собакам перорально, принудительно на корень языка или с небольшим количеством лакомства, два раза в сутки, доза подбирается индивидуально с учетом массы животного, типа нервной деятельности и степени возбуждения животного, средние терапевтические дозы указаны в таблице 2.

Длительность терапевтического курса составляет 15 – 20 дней. При наличии признаков сильного возбуждения и психогенных нарушений поведения (агрессия, страх, гиперактивность, чрезмерная вокализация (лай, мяуканье), гиперсексуальное поведение, мечение помещения мочой) курс применения может быть продлен до 4 недель.

Таблица 2

Масса животного, кг	Разовая доза препарата	
	Стоп-стресс® таблетки 2	Стоп-стресс® таблетки 5
до 5	¼ таб.	–
от 5 до 10	¼ – ½ таб.	–
от 10 до 20	½ – 1 таб.	–
от 20 до 30	1 – 1 ½ таб.	¼ – ½ таб.
от 30 до 40	1 ½ – 2 таб.	½ – 1 таб.
от 40 до 50	–	1 таб.
от 50 и выше	–	1 – 2 таб.

При повторном проявлении у животных признаков возбуждения и/или нарушений поведения, курс применения препарата повторяют в тех же дозах, по той же схеме.

В целях профилактики стрессов (транспортировка, приход гостей, смена обстановки, отъезд хозяина, участие в выставках и соревнованиях) препарат применяют за 3 – 5 дней до предполагаемого мероприятия и в течение 1 – 4 дней после его окончания (до исчезновения признаков повышенного возбуждения животного).

Для коррекции поведения при повышенной половой активности Стоп-стресс® таблетки 2 и 5 применяют в тех же дозах совместно с контрацептивными лекарственными препаратами.

Длительность курса применения зависит от индивидуальной чувствительности животного и степени его возбудимости, но не должна превышать 4 недель.

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата в редких случаях возможны сонливость или возбуждение, раздражительность, тошнота, аллергические реакции. В таких случаях применение препарата прекращают и назначают животному симптоматические и десенсибилизирующие лекарственные средства.

17. При передозировке препарата у животного может наблюдаться сонливость, тошнота, рвота, снижение артериального давления, нарушение функции желудочно-кишечного тракта. В этих случаях необходимо промыть желудок, назначить энтеросорбенты и симптоматические средства в соответствии с инструкциями по их применению.

18. Стоп-стресс® таблетки 2 и 5 при совместном применении усиливают и пролонгируют действие транквилизаторов, нейролептиков и противосудорожных средств.

19. В редких случаях при первом приеме препарата у животного может наблюдаться сонливость и тошнота, которые самопроизвольно проходят и не требуют применения лекарственных средств.

21. Стоп-стресс® таблетки 2 и 5 не предназначены для применения продуктивным животным.

ООО «Апиценна», 143985,
Московская область, г. Балашиха,
Полтевское шоссе, владение 4.

ООО «Апиценна», 143985,
Московская область, г. Балашиха,
Полтевское шоссе, владение 4. ...
+ 7 (495) 580-77-13,
www.apicenna.ru, info@apicenna.ru.

4