

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Ветбицина-3 для инъекций для лечения болезней  
бактериальной этиологии сельскохозяйственных животных  
(организация-разработчик ОАО «Синтез», г. Курган)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Ветбицин-3 (Vetbicinc-3).

Международное непатентованное наименование: бензатина бензилпенициллин, бензилпенициллина натриевая соль, бензилпенициллин прокаина.

2. Лекарственная форма: порошок для приготовления раствора для инъекций.

Ветбицин-3 в качестве действующих веществ содержит смесь трёх антибиотиков:

для дозировки 600 000 ЕД: бензатина бензилпенициллина - 200 000 ЕД, бензилпенициллина натриевой соли - 200 000 ЕД, бензилпенициллин прокаина - 200 000 ЕД;

для дозировки 1 200 000 ЕД: бензатина бензилпенициллина - 400 000 ЕД, бензилпенициллина натриевой соли - 400 000 ЕД, бензилпенициллин прокаина - 400 000 ЕД.

Лекарственное средство представляет собой белый или белый со слегка желтоватым оттенком порошок, образующий при прибавлении воды стойкую сусpenзию.

3. Препарат выпускают расфасованным по 600 000 ЕД и 1 200 000 ЕД во флаконы нейтрального стекла вместимостью 10 мл или 20 мл, герметично укупоренные резиновыми пробками и обкатанные колпачками алюминиевыми.

4. Ветбицин-3 хранят в упаковке организации-производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0 °C до 25 °C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства.

Запрещается использовать Ветбицин-3 после окончания его срока годности.

5. Ветбицин-3 следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

## II. Фармакологические свойства

7. Ветбицин-3 – комплексный антибактериальный препарат, содержащий три биосинтетических пенициллина, обладает широким спектром антибактериального действия в отношении преимущественно грамположительных микроорганизмов, включая стрептококки, стафилококки, пневмококки, диплококки, спирохеты, сибиреязвенную палочку, коринебактерии; не действует на анаэробные бактерии, микобактерии, грибы, вирусы и риккетсии.

Механизм бактерицидного действия пенициллинов основан на ингибиции ферментов транспептидазы и карбоксипептидазы, что приводит к нарушению связей между молекулами пептидогликана и разрушению бактериальной клетки.

После внутримышечного введения компоненты Ветбицина-3 всасываются в кровь, медленно гидролизуются с высвобождением бензилпенициллина, достигая максимальной концентрации через 12-24 часа, и сохраняются в терапевтической концентрации на протяжении 3-4 суток. Пенициллины выводятся из организма главным образом почками и частично через кишечник.

Ветбицин-3 для инъекций по степени воздействия на организм относится к высокоопасным веществам (2 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

## III. Порядок применения

8. Ветбицин-3 назначают животным, включая сельскохозяйственную птицу, для лечения пастереллеза, бронхопневмонии, заболеваний мочеполовой системы, некробактериоза, стрептококкоза, актиномикоза, эмфизематозного карбункула, а также других первичных и вторичных инфекций, вызванных чувствительными к антибиотикам пенициллинового ряда возбудителями.

9. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к антибиотикам пенициллинового ряда и прокаину применение препарата противопоказано.

10. Перед применением во флакон с препаратом Ветбицин-3, проколов иглой колпачок и пробку, добавляют 5-6 мл воды для инъекций (или стерильного раствора натрия хлорида 0,9 %, или стерильного раствора прокаина 1-2 %), флакон тщательно встряхивают до образования гомогенной суспензии, которую немедленно вводят животному глубоко внутримышечно. В случае если игла попала в сосуд и появилась капля крови, иглу необходимо вынуть и повторить инъекцию в другое место.

Полученную суспензию вводят животным внутримышечно однократно в следующих разовых дозах:

Крупному рогатому скоту	10 000-15 000 ЕД/кг массы животного
Лошадям	10 000-15 000 ЕД/кг массы животного
Мелкому рогатому скоту	15 000-20 000 ЕД/кг массы животного

Свиньям	10 000-20 000 ЕД/кг массы животного
Пушным зверям	50 000-60 000 ЕД/ животное
Кроликам	10 000-15 000 ЕД/ животное
Индейкам, гусям, уткам	100 000 ЕД/кг массы животного

При необходимости Ветбицин-3 применяют повторно через 3-4 суток.

11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.
12. Особеностей действия лекарственного препарата при его первом применении не установлено.

13. Препарат вводится однократно.

14. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного средства в соответствии с инструкцией, как правило, не наблюдается.

При возникновении аллергических реакций использование препарата прекращают и вводят адреномиметики подкожно, внутримышечно или внутривенно; раствор кальция хлорида 10 % внутривенно.

15. Сведений о взаимодействии с другими лекарственными препаратами нет.

16. Убой животных на мясо разрешается не ранее чем, через 14 суток после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных.

Молоко от дойных животных, полученное в период лечения и в течение 10 суток после последнего введения препарата, запрещается использовать для пищевых целей. Такое молоко может быть использовано после термической обработки для кормления животных.

#### IV. Меры личной профилактики

17. При работе с препаратом Ветбицин-3 для инъекций следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, немедленно промыть их большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Ветбицин-3. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата и этикетку).

19. Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: Открытое акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»), 640008, г. Курган, проспект Конституции, 7.

Инструкция разработана Открытым акционерным обществом «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»), 640008, г. Курган, проспект Конституции, 7.

В связи с утверждением настоящей Инструкции утрачивает силу Инструкция по применению Ветбицина-3 для инъекций, утвержденная Россельхознадзором 7 августа 2007 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»  
Номер регистрационного удостоверения