

15.10.2024

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Виме-Лайт IV

(организация-разработчик: «Vemedim Animal Health», Song Hau Industrial zone, Dong Phu commune, Chau Thanh district, Hau Giang province, Вьетнам)

Номер регистрационного удостоверения: 704-3-21.24-5217N/ПВИ-3-21.24/06017

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: Виме-Лайт IV (Vime-Lyte IV);
международное непатентованное наименование: тиамин, рибофлавин, пиридоксин, никотинамид, декспантенол, хлорид кальция, сульфат магния, хлорид калия, декстроза.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Виме-Лайт IV содержит в 1 мл в качестве действующих веществ: декстрозу безводную – 45,46 мг, тиамина гидрохлорид – 0,167 мг, рибофлавина фосфат натрия – 0,084 мг, пиридоксина гидрохлорид – 0,20 мг, никотинамид – 2,25 мг, декспантенол – 0,1 мг, хлорид кальция – 0,23 мг, гептагидрат сульфата магния – 0,29 мг, хлорид калия – 0,20 мг, а в качестве вспомогательных веществ – метилпарабен, пропилпарабен и воду для инъекций.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость желтого цвета.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года с даты производства, после первого вскрытия флакона – 28 суток.

Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

4. Препарат выпускают расфасованным по 500 мл в пластиковые флаконы, закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми крышками с вытяжным кольцом. Флаконы комплектуются системой для внутривенной капельной инфузии и инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2°C до 30°C.

6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа препарата: витамины и витаминоподобные средства в комбинациях.

10. Виме-Лайт IV – комбинация витаминов группы В, электролитов и декстрозы и используется как симптоматическая терапия при интоксикации и нарушении обмена веществ.

Благодаря наличию сбалансированного количества витаминов, электролитов и декстрозы препарат на клеточном уровне компенсирует дефицит биологически активных веществ в организме животных, способствует нормализации обмена веществ, является источником энергии, улучшает дезинтоксикационную функцию печени, стимулирует окислительно-восстановительные реакции, повышает неспецифическую резистентность организма.

Элиминация компонентов препарата осуществляется за счет метаболизма в печени. Излишки выводятся, в основном с мочой.

Виме-Лайт IV по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности).

III. Порядок применения

11. Виме-Лайт IV назначают крупному рогатому скоту и свиньям в комплексной терапии для снятия интоксикации и восполнения недостатка витаминов и микроэлементов при воспалительных реакциях и нарушении обменных процессов.

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их следует промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с лекарственным препаратом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Применение препарата в период беременности возможно по показаниям и под наблюдением ветеринарного врача, лактирующим и новорожденным животным препарат применяют без ограничений.

15. Виме-Лайт IV вводят животным внутривенно однократно в дозе 100 мл на 50 кг живого веса. Препарат следует вводить медленно. Возможно повторное введение препарата через 24 часа. Перед применением флакон с препаратом следует тщательно встряхнуть и нагреть до температуры тела животного.

16. При применении препарата Виме-Лайт IV в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства и симптоматическое лечение.

17. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата в соответствии с инструкцией не выявлены.

18. Применение Виме-Лайт IV не исключает применение других лекарственных препаратов.

19. Особенности действия при первом приеме препарата и его отмене не выявлено.

20. Препарат применяется однократно. При необходимости повторного введения препарата следует соблюдать рекомендованный интервал не менее 24 часов.

21. Продукцию животного происхождения можно использовать в пищу без ограничений.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

«Vemedim Animal Health», Song Hau Industrial zone, Dong Phu commune, Chau Thanh district, Hau Giang province, Вьетнам

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО «ТД «РостАгроВет», 143604 Россия, МО, г. Волоколамск, ул. Ямская, 17Б

Генеральный директор
«Vemedim Animal Health»

