

Инструкция

по применению ветеринарного препарата «Витозал»

Общие сведения

«Витозал» («Vitozalum»).

Препарат представляет собой прозрачную жидкость от светлорозового до розового цвета без механических включений.

В 1,0 мл препарата содержится 0,1 г бутафосфана, 0,05 мг цианокобаламина, вспомогательных веществ и растворителя до 1,0 мл.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 50,0, 100,0 и 200,0 мл.

Препарат хранят по списку «Б» в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 5 до плюс 25 С.

Срок годности препарата – 2 года от даты изготовления при условии соблюдения правил хранения и транспортировки.

После вскрытия флакона с препаратом, хранить его можно в герметично закрытом виде не более 48 часов при температуре от плюс 2 С до плюс 8 С.

Фармакологические свойства

Витозал обладает тонизирующим действием на организм животных, оказывает стимулирующее действие на процессы обмена веществ (белковый, углеводный и жировой), улучшает кроветворение, повышает резистентность организма, способствует росту животных, повышает тонус гладкой мускулатуры, миокарда, улучшает регенерацию костной ткани.

Препарат относится к комплексным общеукрепляющим и тонизирующим лекарственным препаратам, нормализует метаболические и регенеративные процессы, оказывает стимулирующее действие на белковый, углеводный и жировой обмен веществ, повышает резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды, способствует росту и развитию молодняка животных.

Входящий в состав препарата бутафосфан способствует улучшению функции печени, стимулирует преобразование АДФ в АТФ, повышает двигательную активность гладкой мускулатуры, стимулирует образование костной ткани.

Цианокобаламин активизирует процессы кроветворения, синтеза нуклеиновых кислот, восстанавливает до нормы уровень лимфоцитов супрессоров, участвует в синтезе метионина, способствует образованию гликогена, мобилизует запасы энергии, необходимые для образования дезоксирибозы и синтеза ДНК.

Препарат хорошо переносится животными разного возраста, в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, сенсибилизирующего, тератогенного и эмбриотоксического действия, не обладает кумулятивными свойствами.

Применение препарата

Витозал животным применяют, в том числе птице:

- при нарушениях обмена веществ, вызванных плохим кормлением, содержанием животных, различными заболеваниями;

- при нарушениях развития животных и болезнях молодняка;
- для стимуляции родовой деятельности и как вспомогательное средство при лечении гипокальциемии и гипомagneмии;
- при послеродовых заболеваниях, истощениях, после тяжелых родов, а также как вспомогательное средство при лечении бесплодия;
- при тетанических судорогах и парезах;
- при вторичных анемиях;
- анемия при гельминтозах;
- для повышения резистентности организма;
- для ускорения и сокращения повышения резистентности организма;
- для ускорения и сокращения процесса линьки у птицы;
- при каннибализме;
- для повышения мышечной активности здоровых животных;
- как тонизирующее средство при перенапряжении и повышенной физической активности у лошадей (за 2-3 дня до соревнований).

Препарат вводят животным внутримышечно, подкожно, внутривенно (медленно), а птице перорально один раз в сутки в следующих дозах (мл на животное) при острых заболеваниях:

- лошадям, крупному рогатому скоту – 10,0-25,0;
- телятам, жеребятam – 5,0-12,0;
- овцам, козам – 2,5-8,0;
- ягнтятам, козлятам – 1,5-2,5;
- свиньям – 2,5-10,0;
- поросятам-сосунам – 1,0-2,5;
- собакам – 0,5-5,0;
- кошкам – 0,5-2,5.

Цыплятам 1,0-1,5 мл на 1 л питьевой воды; курам-несушкам 2,0-3,0 мл на 1 л питьевой воды.

Длительность применения препарата составляет 4-5 дней.

При хронических заболеваниях, а также здоровым животным препарат вводят в половинной дозе от выше указанных.

В случае необходимости проводят повторный курс через 5-14 дней.

Побочное действие

При применении согласно инструкции побочных явлений не наблюдается.

Однако, у животных с повышенной чувствительностью к компонентам препарата возможны аллергические реакции.

При возникновении аллергических реакций (зуд, покраснение, сыпь) препарат отменить, назначить антигистаминные препараты и препараты кальция.

Особое указание

Убой животных на мясо и использование в пищевых целях мяса, молока и яиц после применения препарата разрешается без ограничений.