

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

25.03.2021

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Зоонорм®

(Организация-разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «ПроБиоФарм»», 142279, Московская область, г. Серпухов, рабочий поселок Оболенск, ул. Строителей, д. 2А, этаж 1, пом. 54)

Номер регистрационного удостоверения: 47-3-8.12-4204/17ВР-3-1.1/00621

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Зоонорм®. Международное непатентованное наименование – бифидобактерии бифидум.

2. Лекарственная форма – порошок для приема внутрь и местного применения.

Зоонорм® содержит живые, сорбированные на частицах активированного угля лиофилизированные клетки *Bifidobacterium bifidum* штамм №1, с добавлением лактозы.

В одной дозе содержится 1×10^7 колониеобразующих единиц (КОЕ) бифидобактерий *Bifidobacterium bifidum* штамм №1.

3. По внешнему виду Зоонорм® представляет собой порошок от светло-серого до темно-серого цвета с черными вкраплениями.

Срок годности – 18 месяцев с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. Срок годности после первого вскрытия первичной упаковки и в разведенном виде – не более 24 часов. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

4. Зоонорм® расфасован по 5, 10, 100 доз (по 850 мг) в пакеты из многослойного металлополимерного материала.

Пакеты с препаратом упакованы в картонные пачки по 10, 30 и 100 штук, обеспечивающие их целостность. В каждую пачку вкладывают инструкцию по применению на русском языке.

5. Зоонорм® хранят и транспортируют в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре не выше 10 °С. Нижняя граница температуры не лимитируется. Допускается хранение (транспортирование) препарата при температуре не выше 25 °С не более 10 дней.

6. Зоонорм® следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Пакеты с препаратом без маркировки, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности упаковки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей, а также не использованные в течение 24 часов после вскрытия, подлежат выбраковке и утилизации с бытовыми отходами.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Биологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа – ветеринарный препарат (сорбированный бифидосодержащий пробиотик).

10. Штамм *Bifidobacterium bifidum №1* является антагонистом широкого спектра патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Микроколонии бифидобактерий, сорбированных на активированном угле, попадая в экологическую нишу, обеспечивают быстрое восстановление нормальной микрофлоры, активизируют восстановительные и метаболические процессы в слизистых оболочках кишечника, пристеночное пищеварение, синтез витаминов и аминокислот, способствуют более полному усвоению кальция, а также оказывают антитоксическое и иммуномодулирующее действие, обусловленное выработкой пептидогликанов, липополисахаридов, тейхоевых и липотейхоевых кислот.

При пероральном введении Зоонорм® не всасывается из ЖКТ и оказывает свое действие только в кишечнике.

III. Порядок применения

11. Зоонорм® применяют всем видам сельскохозяйственных и домашних животных, пушных зверей, птиц и рыб для:

- профилактики и комплексной терапии болезней, протекающих с диарейным синдромом;
- профилактики нарушений обмена веществ и повышения естественной резистентности организма животных;
- восстановления нормальной микрофлоры кишечника после применения антибиотиков, антигельминтиков, кокцидиостатиков и других химиотерапевтических препаратов;
- комплексного лечения микотоксикозов;
- повышения сохранности молодняка и увеличения привесов;
- профилактики аллергических реакций и уменьшения негативных последствий воздействия стресс-факторов;
- рыбам при алиментарных токсикозах и заболеваниях бактериальной природы.

12. Противопоказаний для применения препарата Зоонорм® не выявлено.

13. Специальные меры предосторожности при применении препарата не требуются. При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

14. Допускается применение препарата лактирующим и беременным животным. Особенности применения беременным животным, животным в период лактации и потомству не установлено.

15. Препарат вводят животным и птице перорально, индивидуально или групповым методом с кормом (в виде масляного или водного раствора - корм орошают раствором препарата), молоком, молозивом, заменителем цельного молока, выдержанными при комнатной температуре (от 15 до 25°C). Недопустимо разведение препарата в горячей (выше 38 °C) жидкости! При смешивании сорбированного пробиотика с жидкостью (водой, молоком, заменителем молока, маслом), образуется суспензия с чёрными вкраплениями.

Режим дозирования:

- с профилактической целью Зоонорм® применяют из расчета 1 доза на 1 кг веса животного курсом 5-10 дней. В случае предстоящей вакцинации или стресса (транспортирование, выставки и пр.), препарат назначают за 5 дней до и 5 дней после воздействия стресс-фактора.

С лечебной целью Зоонорм® назначают:

- молодняку сельскохозяйственных животных и птице, с первого дня жизни 1 раз в день из расчета 2-3 дозы на 1 кг веса животного в течение 10-15 дней;

- взрослым сельскохозяйственным животным, в т.ч. птице препарат назначают ежедневно 0,5-1 дозе на кг веса, при необходимости дозировку увеличивают в 2-3 раза, в течение 10-15 дней;

- домашним животным (кошкам, собакам и др.) весом до 5 кг – до 5 доз, от 5 до 10 кг – 10 доз, от 10 до 20 кг – 20 доз, свыше 20 кг – 30-50 доз 2-3 раза в день в течение 7-14 дней. По показаниям курс лечения может быть увеличен до 25-30 дней.

- пушным зверям, лабораторным животным препарат назначают по 2-3 дозы на 1 кг веса животного 1 раз в день в течение 7-14 дней. По показаниям курс лечения может быть увеличен до 25-30 дней.

- рыбам препарат дают с кормом из расчета 5 доз на 1 кг ихтиомассы, в течение 10-15 дней. Препарат смешивают с 50-100 мл воды и орошают сухой корм при перемешивании до равномерного пропитывания всей массы корма.

Допускается внутриматочный способ введения препарата при комплексной терапии эндометритов у коров. Препарат в количестве 100 доз смешивают с 20 мл стерильного растительного масла комнатной температуры и вводят внутриматочно 1 раз в день в течение 3-5 дней.

16. При применении Зоонорм® в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений не установлено.

17. При передозировке препарата Зоонорм® нежелательных реакций не выявлено.

18. Применение препарата не исключает возможность использования других лекарственных средств. При одновременном приеме препарата с витаминами (особенно группы В), действие препарата усиливается. При приеме

антибиотиков рекомендуемый интервал между пероральным применением антибиотика и препарата Зоонорм® должен составлять не менее 4-5 часов.

19. Особенности действия препарата при первом приеме или при его отмене не установлено.

20. Специальные меры при пропуске приема одной или нескольких доз препарата не предусмотрены, применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

21. Ограничения в сроках убоя сельскохозяйственных животных не установлено. Продукцию от животных и птиц, полученную после применения препарата Зоонорм®, разрешается использовать без ограничений.

Наименования и адреса
производственных площадок
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения:

Общество с ограниченной
ответственностью «ПроБиоФарм»
143981, Московская обл., г. Балашиха,
мкр. Кучино, ул. Южная, д. 11.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя:

Общество с ограниченной
ответственностью «ПроБиоФарм»
142279, Московская область, г. Серпухов,
рабочий поселок Оболенск,
ул. Строителей, д. 2А, этаж 1, пом. 54.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция, утвержденная Россельхознадзором 19 июля ~~2019 г.~~